

藥品異動公告

換藥日期	100.12.06	
換藥原因	變更劑型 (兒科申請)	
新舊說明	舊藥 【OAN4】	新藥 【OSI4】
藥品中文名稱	敏喘克 4mg 咀嚼錠	欣流顆粒劑 4 公絲
藥品英文名稱	Anxokast chewable 4mg	Singulair oral granules 4mg
健保代碼	A047960100	B024134119
許可證字號	衛署藥製字第 047960 號	衛署藥輸字第 024134 號
主成分及含量	montelukast.sodium 4mg	montelukast.sodium 4mg
適應症	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀(ALLERGIC RHINITIS)。	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人或小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀(ALLERGIC RHINITIS)。
副作用	口渴、腹痛、運動機能抗進、皮疹	口渴、腹痛、運動機能抗進、皮疹
其他用藥指示	限用於二歲~五歲嬰幼兒	限用於 6 個月~五歲嬰幼兒。
劑型	咀嚼錠	顆粒劑
標記	橢圓形, 淡紅, AX004	白色顆粒劑
藥商名稱	瑩碩生技醫藥股份有限公司	美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.12.13	
換藥原因	藥品無法供應(通知不進口)	
新舊說明	舊藥 【OME1】	新藥 【OMEK】
藥品中文名稱	美格普錠 160 公絲	美克怡錠 “汎生”
藥品英文名稱	Megaplex 160mg	Mekei 160mg
健保代碼	B023593100	A043470100
許可證字號	衛署藥輸字第 023593 號	衛署藥製字第 043470 號
主成分及含量	megestrol acetate 160mg	megestrol acetate 160mg
適應症	再發性或轉移性子宮內膜癌的輔助療法。	再發生或轉移性子宮內膜癌的輔助療法。
副作用	增重、血栓性栓塞、噁心及嘔吐、水腫、禿頭脫毛、發疹。	增重、血栓性栓塞、噁心及嘔吐、水腫、禿頭脫毛、發疹。
其他用藥指示	妊娠婦女避免使用	妊娠婦女避免使用
劑型	錠劑	錠劑
標記	橢圓形, 白色, 有切痕	圓形, 白色, 有切痕
藥商名稱	民橋企業股份有限公司	臺灣汎生製藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	100.12.27	
換藥原因	變更劑型 (藥委決議)	
新舊說明	【ITAM】	【ITAL】
藥品中文名稱	"永信" 達比黴素注射劑 4.5g	達比黴素凍晶注射劑
藥品英文名稱	Tapimycin 4.5gm	Tapimycin Lyo-Injection 4.5gm-凍晶
健保代碼	AC45704220	AC55966220
許可證字號	衛署藥字製第 045704 號	衛署藥製字第 055966 號
主成分及含量	Piperacillin (as Sodium) 4gm Tazobactam (as Sodium)0.5g	Piperacillin (as Sodium) 4gm Tazobactam (as Sodium)0.5g
適應症	對 Piperacillin 具感受性，以及對 Piperacillin 具抗藥性，但對 Piperacillin/Tazobactam 有感受性之 β -lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。	對 Piperacillin 具有感受性，以及對 Piperacillin 具有抗藥性但對 Piperacillin/Tarzobatam 有感受性之 β -lactamase 產生菌株所引起之中至嚴重程度感染。
副作用	腹瀉、頭疼、便秘、噁心、失眠、皮膚癢、嘔吐、消化不良、水腫、焦慮、鼻炎及呼吸困難。	腹瀉、頭疼、便秘、噁心、失眠、皮膚癢、嘔吐、消化不良、水腫、焦慮、鼻炎及呼吸困難。
其他用藥指示	1. 如果發生出血現象，應停用 Tapimycin 並且施予適量治療。 2. 一旦發生重複感染，應採取適當措施。 3. 本藥應置於小兒伸手不及處。室溫(15-30℃)、避光儲存。	1. 如果發生出血現象，應停用 Tapimycin 並且施予適量治療。 2. 一旦發生重複感染，應採取適當措施。 3. 本藥應置於小兒伸手不及處。室溫(15-30℃)、避光儲存。
劑型	240 乾粉注射劑	243 凍晶注射劑
標記		
藥商名稱	永信藥品工業股份有限公司	
外觀		