

藥品異動公告

換藥日期	101.05.02	
換藥原因	廠缺更換	
新舊說明	舊藥 【IDER】	新藥 【IDE1】
藥品中文名稱	立克能注射液 4 公絲	"台裕" 的剎美剎松注射液 4 公絲/公撮
藥品英文名稱	Dexaroid 40mg/10ml	Dexamethasone 4mg/ml
健保代碼	N005328299	A015279209
許可證字號	內衛藥製字第 005328 號	衛署藥製字第 015279 號
主成分及含量	Dexamethasone 40mg/10ml/vial	Dexamethasone 4mg/1ml/amp
適應症	<p> 儂麻質斯性關節炎、儂麻質斯熱、膠 原熱、過敏性疾痲、結締組織炎及關 節炎樣疾痲、重症皮膚病、肉芽腫、 火傷、手術時之休克 </p>	<p> 儂麻質斯性關節炎、儂麻質斯熱、膠 原熱、過敏性疾痲、結締組織炎及關 節炎樣疾痲、重症皮膚病、肉芽腫、 火傷、手術時之休克 </p>
副作用		
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記	1vial=10ml	1amp=1ml
藥商名稱	濟生化學製藥廠股份有限公司	臺裕化學製藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.02	
換藥原因	1001111 藥委決議(12-2)	
新舊說明	舊藥 【IPAI】	新藥 【IBOE】
藥品中文名稱	裴米索注射液 30 公絲/10 公撮	安骨本濃縮注射液 4 毫克/ 5 毫升
藥品英文名稱	Pamisol Concentrated 30mg/10ml	Bonecare 4mg/5ml
健保代碼	B023633229	AC55295221
許可證字號	衛署藥輸字第 023633 號	衛署藥製字第 055295 號
主成分及含量	Pamidronate disodium 30mg/vial	Zoledronic acid 4mg/5ml
適應症	惡性腫瘤之蝕骨性骨頭轉移、惡性高血鈣症。	-與標準癌症治療併用，適用於多發性骨髓瘤及固體腫瘤併有骨骼轉移之病人。用於攝護腺癌病人之骨骼轉移時，應至少接受過一種荷爾蒙治療而仍持續惡化者。-治療惡性腫瘤之高血鈣併發症(HCM)。
副作用	無症狀低血鈣、發燒、疲勞、潮紅、皮疹、搔癢。	發燒、疲勞、潮紅、噁心、嘔吐、皮疹、搔癢。
其他用藥指示	不宜直接靜脈推注，應稀釋後緩慢靜脈輸注(90mg/250ml/2hr)	以 100ml 不含鈣離子的輸注液如 0.9% N/S 稀釋且輸注時間大於 15 分。
劑型	注射劑	注射液
標記		
藥商名稱	新加坡商赫士睿股份有限公司台灣分公司	南光化學製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.04	
換藥原因	1001111 藥委決議(41)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【ODE4】
藥品中文名稱		得舒妥持續性藥效膠囊 4 公絲
藥品英文名稱		Detrusitol SR Prolonged-Release 4mg
健保代碼		B023568100
許可證字號		衛署藥輸字第 023568 號
主成分及含量		Tolterodine l-tartra 4mg
適應症		治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。
副作用		口乾、消化不良、乾眼。
其他用藥指示		請整粒吞服
劑型		持續性藥效膠囊劑
標記		長形, 藍色, 白色的符號及 4
藥商名稱		輝瑞大藥廠股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.10	
換藥原因	1001111 藥委決議(13)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【OMIA】
藥品中文名稱		樂伯克錠 0.25 公絲
藥品英文名稱		Mirapex 0.25mg
健保代碼		B023280100
許可證字號		衛署藥輸字第 023280 號
主成分及含量		Pramipexole 0.25mg
適應症		治療自發性巴金森氏症的徵候及症狀、治療原發性腿部躁動症(PRIMARY RESTLESS LEGS SYNDROME)的症狀。
副作用		嗜睡、噁心、便秘、記憶減退、無力、幻覺。
其他用藥指示		可能思睡, 避免從事開車或操作危險機械
劑型		錠劑
標記		橢圓形, 白色, 有切痕, U/U, 4/4
藥商名稱		臺灣百靈佳殷格翰股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.11	
換藥原因	1001111 藥委決議(07)	
新舊說明	舊藥 【ODEN】	新藥 【OXYZ】
藥品中文名稱	"美時" 停敏膜衣錠 5 毫克	驅異樂膜衣錠 5 公絲
藥品英文名稱	DeNosin 5mg	Xyzal F.C 5mg
健保代碼	A045972100	B023792100
許可證字號	衛署藥製字第 045972 號	衛署藥輸字第 023792 號
主成分及含量	Desloratadine 5mg	Levocetirizine 5mg
適應症	季節性過敏性鼻炎引起的相關症狀，緩解慢性原發性蕁麻疹相關症狀。	治療成人及六歲以上孩童因過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹等所引起的各種過敏徵狀。
副作用	頭痛、口乾、噁心、疲勞	口乾、頭痛、疲勞、無力、嗜睡
其他用藥指示		
劑型	膜衣錠	膜衣錠
標記	圓形, 白色, L. 0, 33	橢圓形, 白色, Y
藥商名稱	美時化學製藥股份有限公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.15	
換藥原因	1001111 藥委決議(38)	
新舊說明	舊藥 【OANB】	新藥 【OCEO】
藥品中文名稱	必百欣膜衣錠 375 公絲	"信東" 賜福膠囊 250 公絲
藥品英文名稱	Anbicycyn 375mg	Cero 250mg
健保代碼	AC43952100	AC36082100
許可證字號	衛署藥製字第 043952 號	衛署藥製字第 036082 號
主成分及含量	Amoxicillin 250mg Clavulanic acid 125mg	Cefaclor 250mg
適應症	葡萄球菌、鍊球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具感受性細菌所引起之感染症。	甲族乙型溶血性鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌、大腸桿菌、奇異變形桿菌、克雷氏肺炎桿菌、嗜血桿菌、淋球菌等病原菌所引起之感染。
副作用	腹瀉、偽膜結腸炎、消化不良等胃腸道副作用及蕁麻疹、紅斑性皮膚疹等過敏現象	搔癢症、蕁麻疹、腹瀉、SGOT 及 SGPT 輕微升高。
其他用藥指示		
劑型	膜衣錠	膠囊劑
標記	長橢圓凸, 白色	長圓柱形, 鮮藍紫/白色, CERO, 250MG , 012
藥商名稱	中國化學製藥股份有限公司台中工廠	信東生技股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.21	
換藥原因	1001111 藥委決議更換(12-1)	
新舊說明	舊藥 【IIN2】	新藥 【ILI2】
藥品中文名稱	力保防寧 MCT/LCT 注射液 20%	力保加 20% 脂肪乳劑輸注液
藥品英文名稱	Intrafat 20% 250ml	Lipoplus 20% 250ml
健保代碼	B018307265	B024919265
許可證字號	衛署藥輸字第 018307 號	衛署藥輸字第 024919 號
主成分及含量	Soybean oil 100mg/ml ; Triglycerides 100mg/ml;Egg phosphatides 12mg/ml.etc	Soya oil 80mg/ml;Triglycerides 100mg/ml;Omega-3-Acid 20mg/ml,..etc
適應症	靜脈營養治療患者之熱量供給	提供無法正常進食或攝取量不足之成人所需的脂肪，包括必須脂肪酸。
副作用		
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	臺灣柏朗股份有限公司	臺灣柏朗股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.21	
換藥原因	1001111 藥委決議(36)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【EEXL】
藥品中文名稱		憶思能穿皮貼片 5
藥品英文名稱		Exelon Patch 5 4.6mg
健保代碼		B0252343FA
許可證字號		衛署藥輸字第 025234 號
主成分及含量		Rivastigmine 9mg
適應症		輕度至中度阿滋海默氏病之癡呆(失智)症。
副作用		噁心、嘔吐、腹瀉、厭食/食慾不振、體重減輕。
其他用藥指示		請貼於潔靜乾燥無毛髮處如上背上臂，每天更換不同部位貼。
劑型		穿皮貼片劑
標記		Exelon®Pach5 AMCX
藥商名稱		台灣諾華股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.22	
換藥原因	1001111 藥委決議(4)	
新舊說明	舊藥 【OAU】	新藥 【OAU1】
藥品中文名稱	安滅菌錠 375 毫克	安滅菌膜衣錠 1 公克
藥品英文名稱	Augmentin 375mg	Augmentin 1g
健保代碼	B018155100	B022612100
許可證字號	衛署藥輸字第 018155 號	衛署藥輸字第 022612 號
主成分及含量	Amoxicillin 250mg Clavulanic acid 125mg	Amoxicillin 875mg Clavulanic acid 125mg
適應症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
副作用	腸胃道反應如腹瀉、消化不良、噁心、嘔吐。過敏反應如蕁麻疹、紅斑疹。	腸胃道反應如腹瀉、消化不良、噁心、嘔吐。
其他用藥指示	藥品應保存於原包裝內, 使用前再剝開。	藥品應保存於原包裝內, 使用前再剝開。整粒吞服, 勿咀嚼。
劑型	錠劑	膜衣錠
標記	長橢圓凸, 白色, AUGMENTIN	長圓柱形, 白色, 有剝痕, A/C
藥商名稱	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.24	
換藥原因	1001111 藥委決議(05)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【OZYR】
藥品中文名稱		驅特異內服液劑 0.1%W/V
藥品英文名稱		Zyrtec 60ml oral Solution 0.1% W/V
健保代碼		B021839151
許可證字號		衛署藥輸字第 021839 號
主成分及含量		Cetirizine Dihydrochloride 1mg/ml
適應症		季節性鼻炎、結膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。
副作用		頭痛、眩暈、嗜睡、口乾、精神激昂
其他用藥指示		1. 從事開車或操作危險機械者, 謹慎使用。 2. 避免與過量酒精併服。
劑型		內服液劑
標記		琥珀色玻璃瓶
藥商名稱		荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.26	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【OVB2】	新藥 【OASU】
藥品中文名稱	維他命 B2 錠 5 公絲	亞賜達福膜衣錠
藥品英文名稱	Vitamin B2 5mg	Asutaf F.C. tab.
健保代碼	A021737100	A041318100
許可證字號	衛署藥製字第 021737 號	衛署藥製字第 041318 號
主成分及含量	Riboflavin 5mg	Prothiamine 50mg Riboflavin 5mg
適應症	口唇炎、舌炎、口角糜爛	維他命 B 1、B 2 缺乏症。
副作用		
其他用藥指示	尿液會呈現橘黃色	尿液會呈現橘黃色
劑型	錠劑	膜衣錠
標記	圓形, 黃色	圓形, 黃色
藥商名稱	合誠化學製藥股份有限公司	元宙化學製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.26	
換藥原因	廠商更換	
新舊說明	舊藥 【IKEO】	新藥 【IKEL】
藥品中文名稱	克多炎注射液 30 毫克/毫升	刻痛治注射液 30 毫克/毫升
藥品英文名稱	Keto 1ml	Kerolac 30mg/ml
健保代碼	AC42412209	AC46348209
許可證字號	衛署藥製字第 042412 號	衛署藥製字第 046348 號
主成分及含量	Keterolac tromethamine 30mg/1ml	Keterolac tromethamine 30mg/1ml
適應症	短期(≤5 天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛,通常使用於手術後。	短期(≤5 天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛,通常使用於手術後。
副作用	噁心、胃潰瘍、水腫、嗜眠、眩暈、發汗、搔癢、紫斑。	噁心、胃潰瘍、水腫、嗜眠、眩暈、發汗、搔癢、紫斑。
其他用藥指示		
劑型	注射劑	注射劑
標記		
藥商名稱	永信藥品工業股份有限公司	永甲興業股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.23	
換藥原因	1001111 藥委決議(21)	
新舊說明	舊藥 【 】	新藥 【 OVIE 】
藥品中文名稱		惠立妥膜衣錠
藥品英文名稱		Viread 300mg
健保代碼		B024690100
許可證字號		衛署藥輸字第 024690 號
主成分及含量		Tenofovir Disoproxil fumarate 300mg
適應症		Viread 適用於與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用於成人 HIV-1 感染之治療。用於治療具有病毒複製及活動性肝臟發炎證據的成人慢性 B 型肝炎患者。
副作用		常見副作用，包括噁心、嘔吐、腹瀉、疲倦無力，比較少見的則有肝功能異常、腹痛、漲氣。 最嚴重的副作用，包括乳酸中毒、肝毒性、骨質缺乏與骨質流失、腎臟病變。
其他用藥指示		
劑型		膜衣錠
標記		
藥商名稱		禾利行股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	101.05.29	
換藥原因	1001111 藥委決議(32)	
新舊說明	舊藥 【OXA4】	新藥 【OAC6】
藥品中文名稱	善寧 400mg	愛克痰發泡錠 600 公絲
藥品英文名稱	Xanthium 400mg	Actein Effervescent 600mg
健保代碼	B019567100	A045993100
許可證字號	衛署藥輸字第 019567 號	衛署藥製字第 045993 號
主成分及含量	Theophyllinum monohydricum 400mg	Acetylcysteine 600mg
適應症	氣喘及支氣管痙攣。	減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性、蓄意或偶發之 ACETAMINOPHEN 中毒之解毒劑。
副作用	噁心、嘔吐、腹瀉、失眠、顫抖、抽搐、心悸、心律不整	偶爾發生胃腸障礙如噁心和嘔吐，極少出現諸如皮疹和支氣管痙攣等過敏反應。
其他用藥指示	避免服用含大量咖啡因飲料。 整粒吞服。	發泡錠置於玻璃容器中，加少量的水溶解，混勻服用。 有甜味劑阿斯巴甜(Aspartame)，故苯酮尿患者不宜使用。
劑型	持續性藥效膠囊劑	發泡錠
標記	透明/白色膠囊，內含白色顆粒	白色圓形錠、SYG
藥商名稱	天義企業股份有限公司	健喬信元醫藥生技股份有限公司
外觀		