

藥品異動公告

換藥日期	98.09.09	
換藥原因	新藥	
新舊說明	舊藥 【】	新藥 【OPOT】
藥品中文名稱		補骨挺疏 2 公克
藥品英文名稱		Protos 2g
健保代碼		無
許可證字號		衛署藥輸字第 024763 號
主成分及含量		Strontium 2g/pk
適應症		停經後婦女骨質疏鬆症之治療，以降低脊椎骨折與髖骨骨折的風險。
副作用		嘔吐、上腹痛、口腔炎、口腔潰瘍、過敏反應（皮疹）、頭痛、噁心、下痢、皮膚炎
其他用藥指示		<ol style="list-style-type: none"> 1. 每日一次、每次一包、加水至泡成懸液劑後服用。 2. 吸收會受食物、牛奶及其他衍生物影響而降低，所以服藥品兩小時內，避免服用含鈣食物。 3. 每日需補充鈣(1500mg)與維他命D(400IU-800IU)。 4. 如發生過敏反應，特別是皮膚紅疹，停用並儘速回診。
劑型		口服顆粒劑
標記		28 包/盒
藥商名稱		新加坡商施維雅股份有限公司台灣分公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.09.14	
換藥原因	更換劑量	
新舊說明	舊藥 【OSNG】	新藥 【OAN4】
藥品中文名稱	欣流 咀嚼錠 5 毫克	敏喘克咀嚼錠 4 毫克
藥品英文名稱	Singulair chewable tablet 5mg	Anxokast chewable tablets 4mg
健保代碼	B022779100	A047960100
許可證字號	衛署藥輸字第 022779 號	衛署藥製字第 047960 號
主成分及含量	Montelukast sodium 5mg	Montelukast sodium 4mg
適應症	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀，及防止運動引起的支氣管收縮。緩解成人及小兒的日間及夜間過敏性鼻炎症狀	適用於預防與長期治療成人及小兒的氣喘，包含預防日間及夜間氣喘症狀及防止運動引起的支氣管收縮、緩解成人及小兒的日間及夜間季節性過敏性鼻炎症狀(seasonal allergic rhinitis)。
副作用	口渴、嗜眠、散瞳、腹痛、過動	口渴、嗜眠、散瞳、腹痛、過動
其他用藥指示	6-14 歲兒童，每日睡前服用 5mg。 15 歲以上，每日睡前服用 10mg。	適合 2-5 歲兒童服用，每日睡前 1 錠
劑型	咀嚼錠	咀嚼錠
標記	圓形、粉紅色、SINGULAIR、MSD/275	橢圓形，淡紅色，AX/004
藥商名稱	美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司	瑩碩生技醫藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.09.14	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【EPRT】	新藥 【EPR5】
藥品中文名稱	普特皮軟膏 0.03% 10gm	普特皮軟膏 0.03% 5gm
藥品英文名稱	Protopic ointment 0.03% 10gm	Protopic ointment 0.03% 5gm
健保代碼	B023345329	B023345321
許可證字號	衛署藥輸字第 023345 號	衛署藥輸字第 023345 號
主成分及含量	Tacrolimus 0.3mg/gm	
適應症	第二線使用於 2 歲以上孩童、青少年及成人因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療的中度至重度異位性皮膚炎患者，作為短期及間歇性長期治療。	
副作用	依發生頻率的多寡依序包括：震顫、頭痛、感染、感覺異常和腎功能異常、其他發生頻率較少者詳見仿單。	
其他用藥指示	使用 Protopic 軟膏期間應盡量減少或避免露於天然光或人造光（曬黑床或 UVA/B 治療）之下	
劑型	軟膏劑	軟膏劑
標記	綠色環線	橘棕色環線
藥商名稱	台灣安斯泰來製藥股份有限公	台灣安斯泰來製藥股份有限公司
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.09.14	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【ITN5】	新藥 【IT-5】
藥品中文名稱	台大五號注射液 500ml	台大五號注射液 400ml
藥品英文名稱	Taita No.5 500ml	Taita No.5 400ml
健保代碼	A022682277	A022682271
許可證字號	衛署藥製字第 022682 號	衛署藥製字第 022682 號
主成分及含量	每 ml 含有 Sodium chloride .82 mg/ml Potassium acetate 0.59 mg/ml Sodium acetate 1.8 mg/ml Magnesium chloride h 0.3 mg/ml Dextrose anhydrous 100 mg/ml Potassium phosphate 1.63 mg/ml	每 ml 含有 Sodium chloride 0.82 mg/ml Potassium acetate 0.59 mg/ml Sodium acetate 1.8 mg/ml Magnesium chloride h 0.3 mg/ml Dextrose anhydrous 100 mg/ml Potassium phosphate 1.63 mg/ml
適應症	手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充、維持液	手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充、維持液
副作用	急速地大量注入時有腦浮腫、肺水腫、末梢肢端水腫的現象。	急速地大量注入時有腦浮腫、肺水腫、末梢肢端水腫的現象。
其他用藥指示	1. 末梢或中央靜脈注射 2. 藥品為無色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。	1. 末梢或中央靜脈注射 2. 藥品為無色澄明液，若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
劑型	注射劑	注射劑
標記	500ml 塑膠瓶裝	400ml 塑膠瓶裝
藥商名稱	臺灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠	臺灣大塚製藥股份有限公司中壢工廠
外觀		

藥品異動公告

換藥日期	98.09.21	
換藥原因	停產更換	
新舊說明	舊藥 【IB-C】	新藥 【ICOB】
藥品中文名稱	美康保注射液	康必補力針
藥品英文名稱	B-complex 1ml	Combeplex 1ml
健保代碼	N012925209	N003067209
許可證字號	內衛藥製字第 012925 號	內衛藥製字第 003067 號
主成分及含量	Vitamin B1 100mg、Vitamin B2 5mg、 Vitamin B6 5mg、Nicotinamide 50mg Sodium pantothenate 5mg Benzyl Alcohol 10mg	Vitamin B1 100mg、Vitamin B2 5mg、 Vitamin B6 5mg、Nicotinamide 50mg Sodium pantothenate 5mg
適應症	腳氣病、熱性傳染病之補助治療、 神經炎	維他命 B 群之缺乏症
副作用		
其他用藥指示	須貯存於冷暗處。	須貯存於陰涼處。
劑型	注射劑安瓿	注射劑安瓿
標記		
藥商名稱	南光化學製藥股份有限公司	信東生技股份有限公司
外觀		