



## 病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人  
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

# 頭孢子類(cephalosporin)口服抗生素

### 【本院商品】

院內 商品名	Cephalexin cap. (賜福力欣)	Cero cap. (賜福)	Cefspan cap. (速復適康)	Seftem cap. (協復鼎)
成份	Cephalexin 500mg/膠囊劑	Cefaclor 250mg/膠囊劑	Cefixime 100mg/膠囊劑	Ceftibuten 100mg/膠囊劑
一般 用法	每6小時一粒	每8-12小時一粒	早晚一粒	早晚各二粒
外觀				

**【作用】** 本類藥品為治療細菌感染的抗生素。可與細菌合成之細胞壁結合，使細菌無法合成細胞壁，進而達到殺死細菌的目的。

### 【注意事項】

1. 治療期間即使感染症狀消失，仍需繼續使用。完成整個療程才能根治，不可擅自停藥，否則可能復發。
2. 如果忘記服藥，請盡快服用；假如已接近下次服藥的時間，只要服用下次的用藥就好。不可一次服用兩次的藥量。
3. 若曾對此藥或其他抗感染用藥過敏者，請告知您的醫師或藥師。
4. 若您有(或曾經有)肝腎疾病者，或同時有使用其他藥物，請主動告知醫師。
5. 若您有計劃懷孕或已懷孕與授乳之婦女，請事先告知醫師。
6. 可能會引起頭暈，在未知藥品對您的影響之前，請勿開車或操作危險之機械。
7. 每一種藥物都有副作用，若有以下情形，請勿太驚慌：噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，若症狀持續或嚴重，請告知醫師。
8. 如有腸胃藥可能會造成胃不舒服，服藥時最好併服食物或牛奶。
9. 若有下列情形請停藥，並立即就醫：皮膚癢、呼吸困難、出疹、蕁麻疹、抽搐等過敏反應。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。