



病患用藥 指導單張








JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

青黴素 (Penicillins) 口服抗生素

【本院商品】

院內 商品名	Dicloclon cap. (德可信膠囊劑)	Ampicillin cap. (安西林膠囊劑)	Amoxicillin cap. (安莫西林膠囊劑)	Augmentin tab. (安滅菌膜衣錠)	Unasyn tab. (優耐迅錠劑)
成份	Dicloxacillin 250mg	Ampicillin 500mg	Amoxycillin trihydrate 500mg	amoxicillin 875mg + Clavulanic potassium 125mg	Sultamicillin tosylate 375mg
一般 用法	每6小時一錠 (空腹服用)	每6小時一錠 (空腹服用)	一天3-4次， 每次一錠	早晚一錠 (建議於用餐開始時服用)	每天2-3次，每 次一錠
外觀					

【作用】 本類藥品為治療細菌感染的抗生素。

【劑量與用法】

1. 請遵照醫師指示服用。平均分配服藥間隔，固定時間服藥。如果睡覺時無法起床服藥，可以將睡覺時間當一間隔，其餘時間均分。
2. 德可信膠囊劑及安西林膠囊劑要空腹（飯前一小時或飯後二小時）服用，並與一杯開水同服。安滅菌膜衣錠建議於用餐開始時服用。
3. 忘記用藥時想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

【注意事項】：

1. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治，否則可能會復發。
2. 服用本藥前有下列事項請告知醫師：曾有藥物過敏、懷孕或授乳、其它疾病（氣喘、枯草熱或腎臟病等）或服用其他藥物。讓醫師決定應否用藥。
3. 安西林膠囊、安蒙西林膠囊、安滅菌膜衣錠及優耐迅錠可能降低某些口服避孕藥的作用，若同時服用，應採取其他避孕措施。
4. 安滅菌膜衣錠容易吸潮，使用前再自鋁箔包中取出。
5. 呼吸困難、氣喘、蕁麻疹、發紅、癢等症狀請停藥，並立即就醫。
6. 噁心、嘔吐、腹瀉、喉頭炎若情況嚴重或持續二天以上，應告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。