



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AI HOSPITAL

藥劑部印製

脈化寧錠 Mafarin 2.5mg tab.

【成分】 Warfarin sodium 2.5mg/錠

【作用】 可用來避免血塊形成或增大。常於用於治療或預防靜脈栓塞症、肺栓塞、心律不整、心臟病發或心臟瓣膜置換手術後使用。

【用法】 請遵照醫師處方之劑量及服法使用，未經醫師指示，切勿自行驟然更改劑量或停藥。

【注意事項】

1. 服藥期間請一定要主動告知您的醫師及牙醫，您正在接受抗凝血藥物 warfarin 治療。
2. 若您近期將接受手術或抽血檢查時，請詳詢您的醫師是否需暫時停藥。
3. 服藥期間請一定要遵照醫師指示定期監測及執行 PT(凝血酶原時間)或 INR 等抽血檢驗，確認藥物在合適的劑量範圍確保您的用藥安全。
4. 請告訴醫師您正在服用的藥物，特別是其他的心臟用藥、抗生素、aspirin、cimetidine，治療高血脂症或疼痛的藥物及維他命。許多藥物會干擾 warfarin 的藥效。未經告訴醫師前，不可使用任何新藥。
5. 某些特定食物與保健食品會改變 warfarin 的藥效。如過度攝取富含維生素 K 的蔬菜(如: 菠菜、甘藍菜、綠色花椰菜、萵苣、綠蘆筍...等)、豬肝、綠茶、含 Q10 的保健食品、貫葉連翹...等，可能會降低藥效。過度飲酒、蔓越莓、鳳梨酵素、中草藥(如: 當歸、大蒜、人蔘、銀杏、丹蔘)及其他具活血化癥效果之中藥均要避免，所以請儘可能保持固定之飲食習慣，避免因過度改變而影響藥效。
6. 請避免讓自己受傷，盡量使用軟毛牙刷或安全的電動刮鬍刀。
7. 服藥期間若有不正常出血的狀況(如: 不正常的瘀青、牙齦出血、月經血量增加、流鼻血等症狀)或瘀傷；不明原因的發燒、腹痛或腹瀉，應立即就醫。
8. 若您於服藥期間持續發生，不明原因且持續性地出現頭暈、疲倦、皮疹或搔癢、食慾不振、胃腸不適、手腳麻木、臉部麻痺、噁心或嘔吐等症狀時，請聯絡您的醫師或藥師並於回診時主動告知醫師。
9. 孕婦、計劃懷孕或授乳婦女請於開始服藥前告知醫師。若於服藥期間懷孕，也請立刻告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。