

病患用藥 指導單張

藥劑部印製

口腔局部用藥

漱口藥水

【院內藥品】

Parmason 寶馬生漱口水 (Chlorhexidine gluconate 2mg/ml, 200ml/bot)

作用：口腔內之殺菌消毒



【用法】

1. 含漱牙齦時，使用適量(成人約 30cc)。含漱數分鐘後吐出。
2. 含漱口腔時，頭向上仰約 30°，使用適量(成人約 30cc)。含漱數分鐘後吐出。
3. 含漱喉嚨時，頭向上仰約 45°，使用適量(成人約 15cc)。含漱數分鐘後吐出。
4. 含漱數分鐘後吐出，再用清水漱幾回可消毒口腔。



口內膠

【院內藥品】

1. Dexaltin oral paste 口炎寧口內膏 (Dexamethasone 1mg/gm, 2gm/tub) 作用：伴生糜爛或潰瘍之難治性口內炎或舌炎
2. Nincort oral gel 寧康口內膏 (Triamcinolone acetonide 1mg/gm, 5g/tub) 作用：齒肉、口腔粘膜、舌、潰瘍性口內炎、口角炎等急慢性炎症之治療
3. Mundisal gel 蒙得莎凝膠 (Choline salicylate 87.1mg/gm, 10gm/tub) 作用：發炎、疼痛、單純皰瘡



【用法】

遵醫指示用法，通常一日一次，最好於就寢時使用，症狀嚴重時，一日 2-3 次適量塗於患處，使用後暫時避免飲食。