



病患用藥 指導單張






JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

心血管藥物 - ARB (血管張力素受體阻斷劑)

【本院商品】

院內 商品名	Diovan F.C. 160mg tab. (得安穩)	Blopress 8mg tab. (博脈舒)	Olmetec F.C. 20mg tab. (雅脈)
成份	Valsartan 160mg/tab	Candesartan cilexetil 8mg/tab	Olmetec medoxomil 20mg/tab
外觀			

【作用】 單獨或與其他藥品合併使用於高血壓及心衰竭。

【用法】 請遵照醫師或藥師指示服藥，一般服藥次數為每日 1 次。

【副作用發生及處理】

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：頭痛、腸胃不適、腹痛、腹瀉、便秘、腸胃氣脹。上述症狀若持續且加重，應回診告知醫師。
2. 肌肉疼痛、觸痛、虛弱無力或痙攣（無論是否有發燒）；肝功能異常（如噁心、嘔吐、異常疲勞）、黃疸（皮膚變黃、茶色尿液）請立即就醫。

【注意事項】

1. 謹慎遵守醫師指示的特別飲食。
2. 確認您的醫師知道您正在服用鉀補充劑、其他鹽類補充劑及利尿劑。
3. 確認您的醫師知道您正在懷孕或授乳。
4. 確認您的醫師知道您有肝腎疾病或心衰竭。
5. 切勿未告知醫師自行突然停止服用本劑。
6. 可能發生嗜睡、暈眩及頭昏眼花等現象請小心開(騎)車或操作機器。
7. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
8. 如果忘記服藥，想起時儘快服用。若想起時剛好是下次的服藥時間，則不補服，依照原來時間服用下一次的劑量即可，絕不可一次服用雙倍劑量。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。