



病患用藥 指導單張



口服降血糖藥 - 磺醯尿素類 (Sulfonylureas, SU)

【本院商品】

院內 商品名	Diamicron MR 30mg tab. (岱蜜克龍持續性藥效錠)	Glimepiride 2mg tab. (穩佳醣)	Diabetin 5mg tab. (糖必鎮錠)
成份	Gliclazide 30mg/tab	Glimepiride 2mg/tab	Glyburide (Glibenclamide) 5mg/tab
外觀			

【作用】適用於第二型（非胰島素依賴型）糖尿病患者之口服降血糖藥物；本類藥物可刺激胰島素之分泌並增加組織對胰島素之反應，以達控制血糖之目的。

【用法】

1. 請遵醫師處方用法及劑量服用。若您需更改服藥時間時，則需先詢問過您的醫師。
2. 通常每天服用一次者，請於早餐(或每天第一頓主餐)，每天兩次者於早、晚餐的**飯前 30 分鐘或隨餐服用**；但仍以醫師對患者之個別指示為主。

【副作用發生及處理】

1. 如有**低血糖症狀**(極度飢餓感、心悸、顫抖、持續發冷、冒冷汗、昏亂、頭痛等)，應立即進食含糖飲料或食物，如果汁、糖水、方糖。如未見改善，則應送急診。嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食，並立即送急診。
2. 皮膚**發疹、發癢、發紅、嚴重晒傷**；皮膚、眼睛變黃，大便顏色變淡、尿色變深；不正常出血或瘀血；喉嚨痛、持續發燒等；應立即就診告知醫師。

【注意事項】

1. 飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
2. 服藥期間，應告知醫師所有服用之藥物。
3. 如懷孕或授乳應告知醫師，一般懷孕之糖尿病應以胰島素控制。
4. 應告知醫師腎、肝、心臟、甲狀腺、嚴重感染及內分泌等疾病。
5. 服用時，對陽光可能產生敏感，盡量避免曬太多太陽或防曬措施應做好。
6. 平時有飲酒習慣的人，切勿過量飲酒。飲酒會增加降血糖的作用，且可能使糖尿病發生低血糖或昏迷。應避免飲酒過量或喝含酒精的飲料。
7. 確實遵醫囑檢驗血糖、尿糖，以便醫師評估療效，調整劑量。
8. 如有高血糖症狀(極度口渴、多尿、尿糖)應告知醫師，以調整劑量或飲食。
9. 如有任何手術、牙科處置及急診處理，應告知醫師服用此類藥品。
10. 忘記服藥時儘快服用，但如與下次服藥時間相近，則按時服下次的劑量，不可服二倍量。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。