



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AN HOSPITAL

藥劑部印製

口服降血糖藥 - 二肽基胜肽酶-4 抑制劑 (DPP-4 inhibitor)

【本院商品】

1. Januvia 100mg tab. 佳糖維膜衣錠 (含 Sitagliptin 100mg/tab)
2. Galvus 50mg tab. 高糖優適膜衣錠 (含 Vildagliptin 50mg/tab)



【作用】 適用於第二型（非胰島素依賴型）糖尿病患者之口服降血糖藥物，經抑制腸泌素之水解作用，增強腸泌素作用進而增加胰島素分泌，達降血糖的效果。

【用法】

1. 治療必須在醫師監控下開始的治療必須在醫師監控下開始使用。
2. 正常情況下，Januvia（佳糖維）通常一天服用一次；Galvus（高糖優適）通常一天服用1-2次。可和食物併用，亦可不和食物併用。請遵照醫師處方服用，有任何問題請教藥師或醫師。

【副作用發生及處理】

1. 如有低血糖症狀（極度飢餓感、心悸、顫抖、持續發冷、冒冷汗、昏亂、頭痛等），應立即進食含糖飲料或食物，如果汁、糖水、方糖。如未見改善，則應送急診。嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食，並立即送急診。
2. 每一種藥都有副作用，若有以下情況請勿驚慌，Januvia（佳糖維）常見副作用為：腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛；Galvus（高糖優適）常見副作用為：暈眩、顫抖、頭痛、便秘、週邊水腫。若上述情形持續惡化或出現嚴重過敏情形，請立即與醫師聯絡。

【注意事項】

1. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，檢查血糖、糖化血紅素及尿糖，運動應規律。
2. 服用本藥前，若懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、腎臟疾病、其他疾病或同時服用其他藥物，讓醫師決定是否應用藥。
3. 未經醫師處方，請勿任意併服其他藥品。飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
4. 如將有任何手術、或最近曾有嚴重疾病或感染，應告知醫師。
5. 忘記用藥時想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。