



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

耐絞寧錠 Nitrostat 0.6mg tab.(NTG)

【商品名】 Nitrostat 0.6 公絲/錠 (NTG) 耐絞寧

【成分】 Nitroglycerin 0.6mg/錠 (舌下錠)

【作用】 狹心症之治療及預防。舌下含一粒，可擴張冠狀血管，改善心肌缺氧部份之血流。

【用法】

「發作時」

在第一次胸痛發作時，含一粒於舌下。通常有灼熱感，含藥時應坐下，以免血壓下降而發生暈眩。藥效約兩分鐘出現，可維持約三十分鐘。

「五分鐘時」

若舌下含藥五分鐘仍未出現藥效，則再含一粒。

「十分鐘時」

如果接下來的五分鐘後，您的疼痛仍然未解除，再含一粒。

「十五分鐘時」

若含三粒後胸痛仍然沒有緩解，必須儘快送醫。

【注意事項】

1. 當 nitrostat 在舌下溶解時，有些人可能會在舌下輕刺痛感，也可能會感覺輕微的面潮紅、腹部發熱、微眩暈及頭痛，有時病人第一次投與之後可能有輕度至嚴重頭痛之感覺，做危險性工作（如開車、操作機械）時應小心，這些副作用通常並不是其他問題徵兆，但如果您有所顧忌，請告知你的醫師。
2. 在使用後如出現視力模糊、口乾，持續或嚴重的頭痛、皮膚紅疹，臉潮紅，請停止使用，並告知醫師。
3. Nitrostat 絕對不可吞服或嚼碎，否則失去藥效
4. 硝酸甘油放久可能失效，請記得定期回診，並告訴醫師您的胸痛頻率、嚴重度是否減輕。
5. 所有日常活動請遵照醫師指示，如：戒煙、戒酒、控制體重、減少劇烈運動等。
6. 請隨時確認您手邊的藥量是否足夠，尤其是假期前或旅行前。
7. 除非經醫師指示，孕婦、授乳婦及小孩應避免使用。
8. 請勿與 viagra（威而剛）併用。

【保存方法】

1. 應置於原裝棕色瓶內（避免用紙、塑膠、透光容器...等包裝），栓緊瓶蓋，儲存於室溫避光下。瓶子一經開封就要將裡面棉花丟棄。
2. 請隨身攜帶，但不宜貼身存放（不要放在襯衫口袋），因體溫可能會減藥效。
3. 當他暴露在高溫中、使用期限超過、開始形成粉末時，應換一瓶新的 Nitrostat。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。