



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

陰道凝膠與乳膏


【本院商品】

院內 商品名	Sutrol Gel-Vaginal (素女潔陰道用凝膠)	Premarin vaginal cream (普力馬林陰道乳膏)
成份	Metronidazole 7.5mg/gm, 25gm/tub	Conjugated estrogens 0.625mg/g, 14g/tub
作用	治療細菌性陰道炎	萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症
用法	一次5gm，一天一次或二次，連續五天，若一天一次應於就寢時用。	1天1/2-2g，疾病嚴重性來決定劑量，通常給藥三星期，休息一星期。
外觀		

【使用方法】


1. 塗藥管之充填-

將塗藥管旋上藥管口→拉開施藥器之壓縮管，壓擠軟管依所需劑量壓入塗藥管內→將塗藥器從藥管嘴上移除。



2. 塗藥管之使用-

躺下後膝蓋彎曲→將含有藥膏的塗藥器輕輕插入陰道深部，推動推管將藥膏完全推入陰道內→推壓縮管導入藥物至使用完畢後，取出。



3. 塗藥管之清理-

取出施藥器後繼續推擠壓縮管至與外管分離→分別以用少許的肥皂和溫水沖洗(切勿使用熱水清洗)。



此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。