



## 病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人  
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

# Nolvadex 10mg tab. 諾瓦得士錠

**【成分】** Tamoxifen 10mg/tab (錠劑)

**【作用】** 本藥可阻斷體內雌性激素之作用，用來治療轉移性乳癌、乳癌手術後之輔助療法。。

**【用法】**

1. 請依照醫師指示按時服用，勿自行增減或任意停藥。
2. 如果服藥後不久便吐出來，請告知醫師，確認是否需補服此次劑量。



**【注意事項】**

1. 本藥可能造成子宮內膜改變（如子宮內膜增生），請配合醫師指示定期作相關檢查。
2. 如果您曾經對本藥成份過敏，請告知醫師。
3. 告訴醫師您正在服用的任何藥品，包括處方藥、非處方藥或草藥等，特別是抗凝血劑、抗癌藥（cyclophosphamide、fluorouracil、methotrexate、mitomycin）、genistein（大豆異黃酮素）、ipriflavone、草藥（Red Clover、St John's Wort）。
4. 本藥會對胎兒造成傷害，因此，服藥期間及停藥後兩個月內均需採可靠的避孕措施，但勿使用避孕藥；若懷疑受孕要馬上告知醫師。服藥期間不可授乳。
5. 若有其它疾病問題，特別是白內障或其它眼睛問題、高膽固醇、肺栓塞或血液異常等，請告知醫師。
6. 服藥期間及停藥後一段時間，可能會有熱潮紅、月經混亂、陰道分泌物增加等現象。
7. 想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。
8. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：熱潮紅或突然出汗、陰道有分泌物、經期不規則、噁心及嘔吐、皮膚紅疹或過敏、腳抽筋、骨頭或腫瘤部位疼痛、手足或下肢水腫、疲倦、眩暈、頭痛、頭髮變少、性慾或性能力減退等，如果症狀持續或令人無法忍受，請告知醫師。
9. 若出現異常的陰道出血、腫瘤部位持續疼痛或發紅、視力模糊、骨盆腔疼痛或有壓迫感、神志不清、下肢水腫且疼痛、呼吸困難、非常的虛弱或思睡等情形，請立即就醫。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。