



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

Navelbine soft cap.

【商品名、成份及外型】

1. Navelbine 20mg soft cap. 溫諾平 20 毫克軟膠囊 (含 Vinorelbine 20mg)
(外型：淺黃色，長圓柱形，軟膠囊，標記-N20)
2. Navelbine 30mg soft cap. 溫諾平 30 毫克軟膠囊 (含 Vinorelbine 30mg)
(外型：淺粉紅色，長圓柱形，軟膠囊，標記-N30)

【作用】抑制癌細胞微小管的聚合，阻斷有絲分裂，促使癌細胞死亡。

【適應症】1.非小細胞肺癌 2.轉移性乳癌。

【用法】

1. 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 請於用餐時以水整顆吞服，不可嚼食或剝開膠囊，補充足夠水分以增加尿液排出量。
3. 併用其他藥物治療時，請確定每種藥品的服用時間，勿任意合用。
4. 服用本藥可能引起噁心、嘔吐的現象；如有這些反應產生，仍需繼續服藥；可請教您的醫師或藥師如何減少這些反應產生。
5. 如果服藥後不久便吐出來，不可再補服。

【注意事項】

1. 如果您曾對本藥有過敏反應，請告知醫師。
2. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
3. 發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛、異常出血或瘀、血尿、血便或黑便、皮膚出現針狀紅點、胸痛、呼吸短促、口腔或唇部潰瘍、腹痛、心跳加快等症狀，請立即就醫。
4. 異常疲勞、虛弱無力、手指（或腳指）麻痺或刺痛等症狀發生，儘速告知醫師。
5. 便秘、失去食慾、噁心、嘔吐、腹瀉、關節或肌肉疼痛等症狀發生，如持續造成您的困擾時，請告知醫師。
6. 因膠囊內含物具有刺激性，不慎接觸膠囊內液時（如不慎嚼食或咬破膠囊），請使用大量清水漱口（如有生理食鹽水更好）。破損的膠囊不可吞食，請退還醫師或藥師處理。
7. 本藥可能對胎兒造成傷害，治療期間需採用可靠的避孕方式（例如：雙重避孕法），若懷疑受孕要馬上告知醫師。服用本藥不可以授乳。
8. 請事先告知醫師您目前使用的所有藥品、曾經作過的任何治療及其它疾病（如肝臟及心臟等疾病）。如需看其他醫師，請主動告訴醫師目前您使用的藥品。
9. 請定期回診以確定療效、追蹤病情及作檢驗。
10. 使用本藥期間及停藥後，除非您的主治醫師指示，否則不可施打疫苗。
11. 在服藥期間應避免大量飲用葡萄柚汁。
12. 請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（如刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。

【保存方法】2-8 °C 冷藏，保持原包裝儲存。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。