



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

Xeloda 500mg tab. 截瘤達

【成分】 Capecitabine 500mg/tab (膜衣錠)

【作用】 截瘤達在身體中轉變成 5 - fluorouracil。在一些病人中，這種物質可殺死癌細胞和縮小腫瘤的大小。

【適應症】 可治療轉移性大腸（結腸直腸）癌、局部晚期或轉移性乳癌病患、晚期胃癌治療。

【用法】

1. 請遵照醫師指示服用，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 本藥於早、晚飯後 30 分鐘內與水吞服。一般建議連續服用 14 天後停藥 7 天，以 21 天為一週期，醫師會決定您需要治療多久。
3. 此藥需與食物併服或進食後 30 分鐘內服用，不可咬碎、磨粉。
4. 如果忘記服藥，不需補服；且於下次服藥的時間也不需服用兩次的藥量，之後依照正常時間服用，並告知您的醫生。

【注意事項】

1. 如果您曾對此藥或 5-fluorouracil 有過敏反應，請告知醫師。
2. 當您所使用處方或非處方的藥物中，包含有制酸劑、Anticoagulants、Folic acid、Leucovorin、Phenytoin 及維他命時，請告知您的醫師。
3. 若您（曾）有心臟、肝臟或腎臟疾病，請告知您的醫師。
4. 服用此藥應避孕，若服藥期間懷孕請立即通知醫師。服用此藥不可授乳。
5. 治療期間，容易感染，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 當您有任何感染症狀（發燒、發冷、咳嗽、嘶啞、下背或側背疼痛、排尿疼痛或困難）出現，請馬上告知醫師。
7. 具光敏感性，請做好防曬措施。
8. 服用此藥期間及停藥後，除非您的主治醫師指示，否則不可施打任何疫苗；與您親近的人（例如家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。
9. 如果併用抗凝血劑，務必監測凝血時間（PT）或 INR，以便調整抗凝血劑之劑量。
10. 如需看其他醫師或牙科醫師，請主動告訴醫師目前您所使用的藥品。
11. 請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（如刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。
12. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、便秘、腹瀉、胃痛、虛弱、疲倦、頭暈、頭痛、失眠、皮膚乾癢、脫水，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
13. 下述症狀若有持續或加重：嚴重腹瀉、嚴重噁心嘔吐、手或腳腫痛、疲勞、喉嚨痛或嘴痛，請立刻回診告知您的醫師。



此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。