



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AN HOSPITAL

藥劑部印製

停經後乳癌治療- 抗雌性激素劑

【本院商品】

成份	Anastrozole 1mg/tab		Letrozole 2.5mg/tab
院內 商品名	Arimidex tab. (安美達錠)	Ansuzole F.C. tab. (安斯如膜衣錠)	Femara F.C. tab. (復乳納膜衣錠)
外觀			

【作用】 停經後婦女且荷爾蒙接受器為陽性的乳癌患者。此藥可減少體內 **estrogen** 的量，因而減少乳癌成長的速度及大小。

【用法】

1. 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
2. 一般為每天服用一錠，若引起胃腸道不適，可與食物或牛奶併服。

【注意事項】

1. 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：疲倦、虛弱、喉嚨痛、關節疼痛、陰道搔癢或有分泌物。
3. 若有下述症狀，請告知您的醫師：胃痛、噁心嘔吐、胸部疼痛，呼吸短促，手或腳發紅、發熱及腫脹，手腳麻或無力，頭暈、頭痛。
4. 用藥期間需定期監測血液、肝功能及血脂肪。
5. 可能會產生熱潮紅，穿著涼爽的衣服或待在涼爽的環境會有所幫助。
6. 告訴醫師正在服用的處方及非處方藥品，包括維他命。
7. 本藥不可在懷孕期間服用，因此，未停經婦女需使用可靠的避孕方式，若服藥期間懷孕請立即通知醫師。
8. 本藥有可能造成骨質疏鬆或骨折，請在服藥期間注意一下骨質狀況，必要時可補充鈣質及維生素 D。
9. 若發現忘了服藥時，請盡速服藥。若已經很接近下一次服藥時間，則跳過這次，到下次服藥時間再服用當次的藥。切記不可一次服用雙倍的藥量。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。