



病患用藥 指導單張



J&H 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

Aromasin 25 mg SC tab. 諾曼癌素糖衣錠

【成分】 Exemestane 25mg/tab (糖衣錠)

【作用】 停經後婦女且荷爾蒙接受器為陽性的乳癌患者。
exemestane 可以干擾身體製造雌性激素，結果使雌性激素減少，進而限制腫瘤的生長。



【用法】

1. 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
2. 一般為每天服用一錠，建議飯後服用。

【注意事項】

1. 有肝、腎、心臟疾病或骨質疏鬆，應告知您的醫生及藥師。
2. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿過於緊張：臉熱潮紅、噁心、疲勞、口水增加、食慾增加、水腫、抑鬱。
3. 若有下述症狀，請告知您的醫師：頭暈、頭痛、疲倦、虛弱、落髮；肌肉、關節或骨頭痠痛；食慾不振、失眠。
4. 用藥期間需定期監測血液及血脂肪。
5. 本藥不可在懷孕期間服用，因此，未停經婦女需使用可靠的避孕方式，若服藥期間懷孕請立即通知醫師。
6. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。若已經很接近下一次服藥時間，則跳過這次，到下次服藥時間再服用當次的藥。切記不可一次服用雙倍的藥量。