



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

Futraful 200mg cap. 富多拉富

【成分】 Tegafur 200mg/cap

【適應症】 化學治療劑。消化系統之癌症（胃癌、結腸、直腸）乳癌等症狀之緩解。

【用法】

1. 通常一天服用二至四次。請遵照醫師指示服用，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 若合併其它藥物治療時，請確定每種藥品之服用時間，勿任意合用。
3. 如果服藥後不久便吐出來，請告知醫師，確認是否需補服此次劑量。
4. 如果及時想起請馬上服用，如果想起時已接近下一次服藥時間則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次服用兩倍量並請告知醫師。



【注意事項】

1. 如果您曾對此藥有過敏反應，請告知醫師。
2. 若您（曾）有心臟、肝臟或腎臟疾病，請告知您的醫師。
3. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物（包括非處方藥品、維他命及中草藥），如抗病毒藥（sorivudine）、抗癲癇藥（phenytoin）、抗癌藥等。
4. 服用此藥應避孕，若服藥期間懷孕請立即通知醫師。服用此藥不可授乳。
5. 治療期間容易感染，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 當您有任何感染症狀（發燒、發冷、咳嗽、嘶啞、下背或側背疼痛、排尿疼痛或困難）出現，請馬上告知醫師。
7. 服用此藥期間及停藥後，除非您的主治醫師指示，否則不可施打任何疫苗；與您親近的人（例如家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。
8. 如需看其他醫師或牙科醫師，請主動告訴醫師目前您所使用的藥品。
9. 請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（如刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。
10. 這個藥會引起噁心、嘔吐，醫師可能會開預防用藥，如果藥物無效請告訴醫師。
11. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：胃腸不適、噁心、嘔吐、食慾減低、掉頭髮、皮膚顏色變深等，如果症狀持續或令人無法忍受，請告知醫師。
12. 若出現發燒、寒顫、異常出血、淤血、皮膚或眼球變黃、倦怠、劇烈腹痛、嚴重腹瀉、昏睡、頭昏、意識障礙、血尿、口腔潰瘍、皮膚紅疹等情形，請立即與醫師聯絡。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。