



病患用藥 指導單張



仁愛醫療財團法人
JEN-AN HOSPITAL

藥劑部印製

Smecta Powder 舒腹達 口服懸液用粉劑

【成分】 Dioctahedral Smectite 3g/包 (橘子香草味, 含蔗糖)

【作用】 急性和慢性腹瀉的治療。

【用法】



年齡		劑量	用法	服藥時間
兒童	1歲以下	每日 1 包	分 3 次服用，每包可與 50 mL 的水或半流質食物（如肉汁、果汁、菜泥或嬰兒食品等）混勻後使用。	宜於兩餐之間服用。 食道炎病人需餐後服用。
	1-2 歲	每日 1-2 包		
	2 歲以上	每日 2-3 包		
成人		每日 3 包	分 3 次服用與半杯水混勻後服用。 治療急性腹瀉時，開始時日劑量可加倍。	

【注意事項】

1. 具吸附作用，可能會干擾其它藥物的吸收與排除，應盡量避免与其它藥物同時服用(建議至少間隔 2 小時)。
2. 不宜併用如 quinidine、disopyramide 類之鹼性藥品。
3. 服用此藥期間如需服用其它藥品時，請主動告訴您的醫師或藥師。
4. 假如症狀在連續服用七天後仍未改善或疼痛併有發燒或嘔吐的現象發生時，則必需立即向醫師或藥師詢問。
5. 舒腹達 (Smecta) 並非補充體液療法，所以不能替代補充體液療法，脫水病患應適當補充體液。
6. 請將本劑連同藥袋放置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。
7. 舒腹達 (Smecta) 不會被胃腸道吸收，不會進入血液循環，由糞便排出。
8. 若忘記服藥，則於想起時儘快服用；如果一天服藥超過兩次以上，若距離下次服藥時間少於 4 小時，則不需要補服，按原時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

【副作用及處理方式】

舒腹達 (Smecta) 的副作用發生比例低，偶爾少數患者會出現便秘，而此情形通常在減低劑量繼續治療後即可緩解。

【懷孕或哺乳】

如果懷孕或哺乳期間，使用前應諮詢您的醫師或藥師。