



# 病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人  
JEN AI HOSPITAL

藥劑部印製

## ELLIPTA Inhalation Powder 易利達乾粉吸入劑

### 準備您的吸入劑

圖1 撕開鋁箔藥盒封蓋來打開藥盒。

圖2 藥盒中裝有一包乾燥劑。將這包乾燥劑丟棄於垃圾桶中。 圖1.

圖3 檢查劑量計數器。在尚未開始使用吸入器之前，劑量計數器會顯示30劑。(當您每一次打開吸口蓋，計數便會減1)





圖2.




圖3.

### 開始使用

#### 步驟一：




圖4.

圖4 打開吸入器的吸口蓋。(將吸口蓋向下滑到底並暴露吸口。您應該會聽到「卡嗒」聲。劑量計數器會遞減1。您不需要振搖此類型的吸入器。您的吸入器現在已經準備好可供吸入使用。)

#### 步驟二：




圖5.

圖5 呼氣。(握住吸入器，但不要靠近您的口部，然後盡量呼氣。切勿將氣吹入吸口。)

#### 步驟三：



圖6.

圖6 吸入您的藥物。(將吸口放在您的雙唇之間，然後閉上雙唇緊含吸口。以長而穩定的方式深吸一口氣。請勿由您的鼻子吸入。)

圖7 切勿讓您的手指擋住通氣孔。




圖8.

圖8 將吸入器自您的口中移開。盡可能摒住這口氣，至少3-4秒(或在您舒適的前提下盡量摒住這口氣)。



圖7.

#### 步驟四：



圖9.

圖9 慢慢輕輕地呼氣。(您可能無法嚐到或感覺到藥物，即使您正確使用吸入器的情況下也是如此。如果您沒有感覺到或嚐到藥物，切勿吸入另一劑量。)

#### 步驟五：




圖10.

圖10 關閉吸入器。(在關上吸口蓋之前，如有需要您可以使用乾面紙清潔吸口。但不需要常態性的清潔。將吸口蓋向上滑動，直到蓋住整個吸口。)

### 重要事項：何時需要準備新的吸入器

圖11 當您的吸入器只剩下小於10劑的劑量。劑量計數器的左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入器。在您使用了最後一劑藥物之後，劑量計數器會顯示數字0，此時您的吸入器已經空了。將空的吸入器丟棄於垃圾桶中。




圖11.

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。