



病患用藥 指導單張



JAM 仁愛醫療財團法人
JEN- AI HOSPITAL

藥劑部印製

耳朵用藥

【如何正確操作】

(為了使操作步驟更簡單，最好請人幫你滴藥)

1. 先使用濕的毛巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。
2. 用肥皂及清水將雙手洗淨。
3. 以側躺或傾斜之姿勢，使將給藥的耳朵朝上。為使耳滴劑流入耳內，成人要將耳朵往後上方拉，小孩要往後下方拉。
4. 將正確的藥量滴入耳朵，然後輕拉耳朵使藥液流入。
5. 保持耳朵傾斜向上數分鐘，使藥品停留在耳朵內。
6. 如耳滴劑滴完後自耳道外漏，請使用沾過藥液之棉球擦拭，因乾棉球擦拭易將藥液吸走。
7. 若需要點雙側，則依據上面的步驟完成一耳的滴劑後再滴另一耳。
8. 使用完畢後，馬上將滴管或瓶蓋歸回原位並將蓋子旋緊。
9. 將雙手洗淨。



©2009 ASHP

成人使用



小孩使用

【使用注意事項】

1. 使用前需檢查滴劑的滴嘴是否有破損。
2. 如遇需冰存之藥品，請放置於冰箱冷藏。使用前務必將藥品握在手心數分鐘以回溫，並於回溫後再使用。
3. 若滴劑是混濁的懸浮液，使用前先充分振搖約十秒鐘。
4. 為保持藥液的清潔，應保持滴管頭的乾淨，應避免其它東西接觸到滴管頭而造成污染。
5. 若症狀持續數日或嚴重時，請停藥並立即就醫或與醫師連絡。

【藥品之儲存】

1. 除有特別指示應置放於冷藏室，否則請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處避光儲存，避免冷凍。
2. 請勿放在孩童可以取得的場所。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。