



## 病患用藥 指導單張





仁愛醫療財團法人  
JEN-AT HOSPITAL

藥劑部印製

# 肛門栓劑

### 【使用方法】

1. 請以肥皂徹底洗淨雙手。
2. 由指示處撕開外包裝。將栓劑迅速放入溫水中濕潤。
3. 如果可以請戴上指套或手套。
4. 側躺後將下方的腿伸直，上方的腿彎曲靠近胸部。
5. 用單手把臀部向上拉，使露出肛門口。用手指將栓劑由較滑尖的一端塞入肛門(約5公分深度)，夾住兩臀(因肛門受刺激致使病人會有將栓劑排出的反射及衝動)。
6. 繼續躺下約15分鐘以避免栓劑被排出。
7. 使用後請徹底洗淨雙手。



### 【注意事項】

1. 如果栓劑變形或軟化，而導致使用困難時，請按下列方法，等栓劑凝固後再使用。
  - A. 栓劑變形：照原塑膠包裝型態，浸入溫水(約40~50°C)中，軟化後再浸入冷水(20°C以下)即可凝固。
  - B. 栓劑軟化：照原塑膠包裝型態，浸入冷水(20°C以下)即可凝固。
2. 藥品不使用時應維持藥廠原包裝，不要打開以免藥品變質失效。
3. 使用後如有黏稠或水狀液體自肛門流出，是因為栓劑放置不夠深入，屬正常現象。

### 【藥品儲存】

1. 請放在陰涼乾燥或避免陽光直射之處。
2. 避免小孩隨意取用，請放在小孩不易取得之處。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。