



病患用藥 指導單張






財團法人
仁愛綜合醫院
JEN-AI HOSPITAL

藥劑部印製

陰道栓劑

【本院商品】

院內商品名	Zalain Vaginal tab. (達來陰道錠)	Albothyl Vag Supp. (安可治陰道栓劑)	Lomexin vaginal Supp. (洛儂欣陰道軟膠囊)
成份	Sertaconazole 500mg/tab	Policresulen 90mg/tab	Fenticonazole nitrate 200mg/tab
外觀			

【使用方法】

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。



2. 打開栓劑外包裝，可將栓劑放入溫水中濕潤。



3. 仰臥彎曲雙腿，輕輕將藥粒用手指推送入陰道深處 3-5 公分即可。



【注意事項】

1. 避免性交或使用保險套，以免再感染。
2. 非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用。
3. 若使用後病情惡化或癢、刺激感時，應立即讓醫師知道。
4. 一般在睡前或醫師指示時間使用。
5. 陰道栓劑應防潮，保存在小孩不易拿到及陰涼處。
6. 栓劑變軟無法塞入時，可放置冰箱冷藏約 30 分或除去外包裝前置於冷水使其變硬。
7. 藥品使用時應放入陰道深處，月經期間仍要繼續用藥，不可擅自中斷用藥。
8. 使用後如有黏稠或水液狀之液體自陰道流出，屬正常現象，可在內褲底部墊衛生棉墊，勿立即進行陰道之沖洗。

【藥品儲存】

1. 請放在陰涼乾燥或避免陽光直射之處。
2. 避免小孩隨意取用，請放在小孩不易取得之處。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。