



病患用藥 指導單張



JAH 仁愛醫療財團法人
JEN-AL HOSPITAL

藥劑部印製

吩坦尼穿皮貼片劑

- 【商品名】** Durogesic D-trans transdermal patch 12ug/h
(多瑞喜穿皮貼片劑 12 微公克/小時)
Durogesic D-trans transdermal patch 25ug/h
(多瑞喜穿皮貼片劑 25 微公克/小時)
Durogesic D-trans transdermal patch 50ug/h
(多瑞喜穿皮貼片劑 50 微公克/小時)

【成分】 Fentanyl base

【作用】 慢性疼痛和頑固性疼痛。

【使用方法】

1. 選擇適當部位，加以清潔及完全乾燥。
2. 使用前才撕開包裝袋，拿出貼片。
3. 取出貼片撕去背膜。
4. 用手掌按 30 秒鐘，確定已經黏好，尤其是四個角。（如會脫落可用透氣膠帶左右邊加強）
5. 使用後，用清水洗手，勿用肥皂用力搓洗，以免皮膚敏感。
6. 每片可貼三天，撕下舊的貼片，對折黏的那一面。放入原來的包裝袋中，不可隨意丟棄，請暫時保留，下次回醫院時，繳回醫院。

【使用需知】

1. 貼在適合位置，如前胸、後背、上手臂、大腿等平坦處（不需要痛哪裡貼哪裡）。
2. 請避開傷口和放射線治療部位。
3. 若無法避免有體毛部位，請剪去（不可用刮或剃）。
4. 每三天換片一次（依醫師指示），請每次換貼不同部位。
5. 你可以洗澡，但避免泡熱水澡，或將貼片直接接觸熱源，例如熱水袋、地毯。
6. 有可能有噁心嘔吐副作用，或偶有微紅疹癢情形，不須太擔心，請告知醫護人員。
7. 如嗜睡、呼吸減少或困難，請立即通知醫護人員。

【特別注意事項】

1. 請務必填記錄表（貼上及撕下的日期時間），並簽名。
2. 用過的貼片請對折放入回收袋。
3. 回診時由醫師簽章，並於領藥時繳回（記錄表及貼片）。

