

## 院內口服藥不建議磨粉品項

10505整理

代碼	英文商品名	劑型	廠商建議事項
OAC6	Actein Effervescent 600 mg tab.	發泡錠	不建議磨粉或剝半
OAD3	Adalat OROS 30mg tab.	持續性藥效錠	不適宜磨粉藥物或把藥物剝半
OAF5	Afinitor 5mg tab.	錠劑	Do not crush or chew
OAGG	Aggrenox modified release cap.	持續性藥效膠囊	不可咀嚼
OAGR	Agrylin 0.5mg cap.	膠囊劑	不適宜磨粉或剝半
OAMD	Am-Daianxo 5mg/80mg tab.	膜衣錠	不建議剝半
OAMT	Amtrel 5mg/10mg tab.	錠劑	可撥半,不建議磨粉
OASA	Asacol 400mg tab.	腸溶錠	不建議磨粉
OAVO	Avodart soft 0.5mg cap.	軟膠囊	swallow capsules whole; do not chew or open
OBIA	Bisacodyl E.C. 5mg tab.	腸溶糖衣錠	請整粒吞服,勿咬碎
OBOK	Bokey 100mg cap.	腸溶微粒膠囊	不建議磨粉
OCA9	Cardizem Retard 90mg tab.	持續性藥效錠	不可分半或咬碎
OCIT	Cintsu SRFC 240mg tab.	持續性藥效錠	不建議磨粉
OCO4	Coxine SR 40mg tab.	持續性藥效錠	可分割成一半,但不可咀嚼
OCOV	Co-Diovan F.C. 80mg/12.5mg tab.	膜衣錠	整粒吞服
OCR5	Cravit 500mg tab.	膜衣錠	應被整顆吞食,可分半服用,不得壓碎咀嚼。
OCRS	Crestor film-coated 10mg tab.	膜衣錠	不建議磨粉
OCUR	Curam 1000mg F.C. tab.	膜衣錠	錠劑需整顆吞服,不可咀嚼。可分成兩半以利吞服,但不可咀嚼。
OCYM	Cymbalta 30mg cap.	膠囊內含腸膜衣藥丸	不可咀嚼、壓碎
ODE4	Detrusitol SR 4mg prolonged-release cap.	持續性藥效膠囊劑	必須整顆吞服,不可磨粉
ODEI	Depakine Chrono F.C. 500mg tab.	持續性藥效錠	吞服本藥時不可壓碎或咬碎錠劑
ODIM	Diamicron MR 30mg tab.	持續性藥效錠	可剝半/不可磨粉
ODOX	Doxymycin 100mg cap.	腸溶膠囊	不宜研磨或咬碎
ODSU	Desud Plus sublingual tab.	舌下錠	須置於舌下,直到完全溶解。
ODXL	Doxaben XL 4mg tab.	持續性藥效錠	不可嚼碎,分割或磨碎
OET	Vepesid (Etoposide) 50mg cap.	軟膠囊劑	
OEX1	Exelon 1.5mg cap.	膠囊劑	必須與水整粒吞服,不可撥開或壓碎
OEX4	Exelon 4.5mg cap.	膠囊劑	必須與水整粒吞服,不可撥開或壓碎
OEXF	Exforge 5mg/80mg tab.	膜衣錠	不建議剝半
OEXJ	Exjade 125mg dispersible tab.	可溶錠	不可咀嚼且不可整顆吞服
OFLA	Frothin 250mg enteric sugar coated tab.	腸溶糖衣錠	不建議磨粉
OFOP5	Fosamax Plus 70mg/5600IU tab.	錠劑	勿剝半/勿磨粉/勿嚼碎
OFU1	Funnix SR 150mg tab.	持續性藥效錠	不可壓碎或嚼碎
OFYC	Fycompa F.C. 2mg tab.	膜衣錠	不建議磨粉或剝半
OFYC4	Fycompa F.C. 4mg tab.	膜衣錠	不建議磨粉或剝半
OGLV	Glivec film-coated 100mg tab.	膜衣錠	tablets may be dispersed in a glass of water or apple juice (50 mL for a 100-mg tablet; 200 mL for a 400-mg tablet); stir until disintegrated and administer

## 院內口服藥不建議磨粉品項

10505整理

代碼	英文商品名	劑型	廠商建議事項
OHAD	Harnalidge D 0.2mg tab.	口溶錠	本藥勿咬碎服用。本藥因含緩釋性顆粒，若以牙齒咬碎時會破壞緩釋顆粒，可能會改變藥物的動態。
OHAO	Harnalidge OCAS prolonged release 0.4mg tab.	膜衣錠	口服藥不適宜磨粉或剝半藥物
OHYD	Hydrea 500mg cap.	膠囊劑	若無法吞服膠囊時，可將膠囊內容物直接倒入一杯水中並立刻服用
OIMD	Imdur CR 60mg tab.	持續性藥效錠	可分成兩半，不可咀嚼或壓碎
OIMI	Imigran FDT 50mg tab.	速溶膜衣錠	錠劑須整顆以水吞服
OINP	Indap S.R. 1.5mg tab.	持續性藥效錠	不建議磨粉
OJAM	Janumet F.C. 50/500mg tab.	膜衣錠	不建議磨粉，剝半
OKEL	Kerlone F.C. 20mg tab.	膜衣錠	勿咀嚼
OKEP	Kepra F.C. 500mg tab.	膜衣錠	不建議磨粉或剝半
OLE8	Lescol-XL film-coated 80mg tab.	緩釋膜衣錠	可撥半(不破壞緩釋劑型);可磨粉但會破壞緩釋劑型
OLEE	Leevk F.C. 100mg tab.	膜衣錠	無法吞服膜衣錠之病人，可將錠劑泡在一大杯水或蘋果汁中服用。可將所需服用的劑量的錠劑泡在適當體積之液體中(100毫克之錠劑泡於大約50公撮之液體中，400毫克之錠劑泡於大約200公撮之液體中)並以湯匙攪拌。懸浮液應在錠劑崩解後立即服用
OLEY	Lesyn F.C. 4mg tab.	膜衣錠	可以磨粉請立刻用完;可以剝半剝半後剩餘1/2請放原泡殼內，避光儲存，於48小內用完(以免抗氧化效價耗損)。
OLIV	Livalo film-coated 2mg tab.	膜衣錠	可以剝半
OLRA	LoraPseudo SR F.C. 5/120mg tab.	持續性藥效錠	不可嚼碎
OMD1	Madopar HBS 100mg/25mg cap.	持續性藥效膠	須確定整顆吞服，並沒有咬碎
OMS3	Morphine sulfate sustained-release "MSSR" 30mg tab.	持續性膜衣錠	不可嚼碎
OMUA	Muaction 100mg tab.	持續釋放錠	不建議磨粉
ONA3	Navelbine 30mg solft cap.	軟膠囊	不可嚼食或剝開膠囊
ONAV	Navelbine 20mg solft cap.	軟膠囊	不可嚼食或剝開膠囊
ONI2M	Nicorette chewing gum 2mg tab.	咀嚼錠	不可磨粉
ONID	Nifedipine S.R.F.C. 30mg tab.	膜衣錠	不適宜磨粉藥物或把藥物剝半
ONOM	Normacol Plus	內服顆粒劑	勿嚼或壓
ONTG	Nitrostat 0.6mg tab.	舌下錠	舌下錠不可吞服只能口腔或舌下使用
OOM2	Omeprotect Enteric-Microencapsulated 20mg cap.	膠囊劑	內容物不宜嚼碎或壓碎
OOXB	Oxibu extended-release 5mg tab.	緩釋錠	不能咀嚼、分開或壓碎
OPAR	Pariet Enteric-Coated 20mg tab.	腸溶膜衣錠	不宜嚼碎或壓碎
OPAT	Pantoloc gastro-resistant 40mg tab.	腸溶膜衣錠	不可嚼碎或壓碎
OPEN	Pentop S.R. 400mg tab.	持續性藥效錠	不建議磨粉
OPHY	Phyllocontin 225mg tab.	持續性藥效錠	需整錠服下不得嚼碎
OPRS	Protase E.M. 280mg cap.	腸溶微粒膠囊	不可壓碎或咀嚼。膠囊可剝開

## 院內口服藥不建議磨粉品項

10505整理

代碼	英文商品名	劑型	廠商建議事項
ORAF	Rafax X.R. 75mg cap.	持續性藥效膠囊劑	不得剝半,咬碎,咀嚼
ORE4	ReQuip PD prolonged release 4mg tab.	持續性藥效膜衣錠	切勿咀嚼,壓碎或剝半
OREE	Renagel 800mg tab.	膜衣錠	不可咀嚼,磨粉,剝半
OREEB	Renagel 800mg tab.(瓶售)	膜衣錠	不可咀嚼,磨粉,剝半
OREL	Revlimid 25mg cap.	膠囊劑	切勿剝開或咀嚼
OREQ	ReQuip PD prolonged release 2mg tab.	持續性藥效膜衣錠	切勿咀嚼,壓碎或剝半
OROA	Roaccutane 10mg cap.	軟膠囊劑	
ORYT	Rytmonorm F.C. 150mg tab.	膜衣錠	整粒吞服(勿咀嚼)
OS21	Sinemet 25/100mg tab.	錠劑	不建議剝半或磨粉
OS22	Sinemet 25/250mg tab.	錠劑	不建議剝半或磨粉
OSAZ	Salazine 500mg tab.	腸溶錠	切勿咬碎
OSN1	Sandimmun Neoral soft gelatin 100mg cap.	軟膠囊劑	切勿剝開或咀嚼
OSN2	Sandimmun Neoral soft gelatin 25mg cap.	軟膠囊劑	切勿剝開或咀嚼
OSPO	Sporanox 100mg cap.	膠囊劑	膠囊應整粒吞服
OST6	Stilnox CR 6.25mg tab.	長效錠	不適宜剝半或磨粉
OSTR	Strocin tab.	錠劑	不要咬碎
OTAK	Takepron OD 30mg tab.	含有腸溶性細粒之口溶錠	不可磨粉
OTAL	Tamlosin S.R. 0.2mg cap.	持續性釋放膠囊	請勿將膠囊內的顆粒咬碎或打開服用
OTAS	Tasigna 150 mg cap.	膠囊劑	不適合剝半和磨粉
OT-C	Tegretol-CR 200mg tab.	膜衣錠	不可咀嚼
OTHN	Throne enteric-sugar coated 100mg tab.	腸溶糖衣錠	不建議磨粉
OTM1	Temodal 100mg cap.	膠囊劑	swallow whole with a glass of water; do not open or chew capsules
OTM2	Temodal 20mg cap.	膠囊劑	swallow whole with a glass of water; do not open or chew capsules
OTOP	Topamax 25mg tab.	膜衣錠	不要將其剝開
OTRO	Tramadol sandoz uno 200mg retardtabletten	持續性藥效錠	不可嚼碎及剝半
OU-C	U-CA 0.25mcg soft cap.	軟膠囊	
OUTR	Utrogestan 100mg cap.	軟膠囊劑	
OVES	Vesicare F.C. 5mg tab.	膜衣錠	不宜磨粉.可剝半
OVO7	Voltaren SR 75mg tab.	持續性藥效錠	應整粒吞服
OVOR	Voren enteric-microencapsulated 50mg cap.	腸溶膠囊劑	不宜嚼碎或壓碎
OWEB	Wellbutrin XL 150mg tab.	持續性藥效錠	不可壓碎或嚼碎
OXAL	Xalkori 250mg cap.	膠囊劑	膠囊應整粒吞服,最好以水送服,並且不可壓碎、溶解或打開
OXAN	Xanthium 200mg cap.	持續性藥效膠囊	不可打開膠囊,亦不可咀嚼或壓碎內容
OZCO	Zcough 100 mg soft cap.	軟膠囊劑	