

## 藥品開封後貯存條件

10505整理

代碼	英文商品名	藥品開瓶後保存方法
EANO	Anoro Ellipta 55/22 mcg Inhalation Powder	自藥盒中取出之後，本品最久可存放6週。
EAVA	Avamys Nasal Spray 120sprays	in -use shelf life: 2 months
EAZT	Azetin Nasal Spray 120dose	避免高溫曝曬/開封後30天內用完
EDAO	Daivobet ointment 30mg	儲存於25°C以下，開封後可使用6個月
EDDA	Minirin Nasal spray (DDAVP)	25°C以下，28天
EFOS	Foster 100/6mcg Metered Aerosol	發藥後：請勿儲存於25°C以上環境(最長可存放5個月)。
ENE4	Neomycin oint. 450gm	不必冷藏但請存於陰涼處
ESEE	Seretide 25/250mcg evohaler	保存期限內
ESI2	Sindine 200 ml	開封使用後,建議貯存一週
ESOF	Sofradex ear drops 8ml	須避光
ESUR	Survanta beractnat intratracheal suspension 8ml	一旦開封未用完應丟棄
EXAM	Xamiol Gel 30gm	容器第一次開封後：3個月。不要冷藏。將瓶子放在外包裝內以避免光照。30°C以下儲存
EXS	Xylocaine spray 10%	8-25°C，半年。
EZAL	Zalain Vaginal tab. 500mg	常溫下避光儲存
I2%	Lidocaine inj. 2% inj. 20ml/vial	室溫下7天，開封後請標註開封日期，7天即應丟棄，每次使用前請檢查如有混濁狀則不可繼續使用
I5FU1	5-Fu injection 1000mg/20ml inj.	稀釋過後應於48小時後棄置更新。
IAAA	Antivenin of D. Acutus 1KIU inj.	本品完全溶解後二小時內用完
IABN	Antivenin of B. Multicinctus and N.Naja Atra 1KIU inj.	本品完全溶解後二小時內用完
IAC	Actilyse 50mg inj.	2-8°C，儲存24小時。
IACL	Aclasta 5mg inj.	After opening the solution, it is stable for 24 hrs at 2-8°C If refrigerated, allow the refrigerated solution to reach room temperature before administration.
IADE	Adenozer 6mg inj.	剩餘藥品如未立即用完應丟棄。
IADI	Adriblastina Rapid Dissolution 10mg inj.	稀釋後室溫下避光下24小時，但在4-10°C時可保存48小時。
IAGI	Agifutol 500mg inj.	溶解後應立即使用，若是分次使用，應保存冷處，且於八小時內用完。
IALI	Alimta 500mg inj.	配製或稀釋後貯存2-8°C或25°C以下，24小時內使用完，未用完部份應丟棄。
IALI1	Alimta 100mg inj.	配製或稀釋後貯存2-8°C或25°C以下，24小時內使用完，未用完部份應丟棄。
IAMF	Aminofluid 1000ml inj.	1.混合後之保存期限- 經證實本品混合三腔室內容物後的化學與物理安定性在25°C下可維持36小時。基於微生物學考量，混合後應立即使用本品。若未立即使用，使用者有責任注意使用中的儲存時間與使用前的儲存條件，通常在25°C的環境下不得超過24小時。 2.與添加物混合後之保存期限- 基於微生物學考量，添加完成後應立即使用本品。若未立即使用，使用者有責任注意使用中的儲存時間與使用前的儲存條件，通常在25°C的環境下不得超過24小時。
IANE	Anexate 0.5mg inj.	稀釋過後應於24小時後棄置更新。
IAP5	Ampolin 500mg inj.	室溫1hr。
IAPH	Aminopoly-H 500ml inj.	開封後，若有剩餘勿再使用。
IATM	Antivenin of TM & TG 1KIU inj.	本品完全溶解後二小時內用完
IAVA	Avastin 100mg inj.	貯存於2-8°C，24小時。
IBEA	Betaferon 0.25mg inj.	根據指示配製後之溶液2-8°C可存放3小時
IBIC	Bicillin L-A 2.4MU inj.	Store in a refrigerator, 2° to 8°C
IBLE	Bleocin 15mg inj.	配製後避光48小時。

## 藥品開封後貯存條件

10505整理

代碼	英文商品名	藥品開瓶後保存方法
IBOE	Bonecare 4mg/5ml inj.	保存在2~8°C冰箱冷藏，從稀釋、冷藏到輸注結束不可超過24小時
IBOL	Bolenic for Solution for IV Infusion 4mg	1.重新配製的溶液在室溫中可於24hrs內，保持化性和物性穩定。2.從重新配製，稀釋，保存在2-8°C的冰箱到輸注結束後不可超過24hrs。
IBOO	Boostrix inj.	本疫苗在容器開封之後應立即使用(開封之後不可置放超過8小時)。
IBOT	Botox 100U inj.	小瓶由冰箱取出且調製後應在三天以內投藥,這三天期間必須是澄清無色且不含顆粒物質
IBRO	Brosym 500mg/500mg inj.	配製後之溶液應立即使用。未使用部分，若置於室溫可保存6小時，存放在冰箱內應在48小時內使用。
ICAM	Campto 100mg inj.	稀釋後立即使用或12hr內輸注完畢，開封後2-8°C下保存24hrs。
ICAN	Carnitene 1g inj.	開瓶後未使用完請丟棄。
ICAO	Carboplatin 150mg inj	室溫8小時，冷藏24小時;避光。
ICEV	Cervarix 0.5ml inj.	請貯存於冰箱中(2°C - 8°C)。切勿冷凍。為避免光線照射，請置於原裝外盒中貯存
ICFA	Cefa 1gm inj.	溶解後需避光，室溫保存，在48小時內使用之;於置冰箱中保存，須在96小時內使用之。
ICHE	Chef 500mg inj.	室溫6小時，5°C 24小時。
ICHI	Chirocaine 5mg/ml solution for inj.	製備後24小時內用。
ICIT	Citosol 500mg inj.	本藥溶液應新鮮配製並盡快使用，配製後超過24hrs未用完即應丟棄。
ICLA	Claforan 2gm inj.	2-8°C 24小時。
ICLI	Clinicin 300mg inj.	Once diluted (in a compatible IV solution) for administration to a patient, preparations may be stored up to 24 hours at room temperature.
ICLX	Clexane 6000 anti-Xa IU inj.	未使用完之藥品應予以捨棄。
ICOI	Colimycin 2MU inj.	本劑注射用蒸餾水溶解後，室溫可保存7天，在冰箱不致凍結之狀態可保存2星期。注射過程無需避光。
ICPZ	C.P.Z. 1gm inj.	15-25°C 24hrs，2-8°C 5day。
ICUB	Cubicin 500mg inj.	稀釋溶液-室溫12hrs，冷藏48hrs，混合後-室溫12hrs，冷藏48hrs。
ICYM	Cymevene 500mg inj.	濃縮液-室溫下12小時，不可冷藏，輸注液-24小時內使用，應冷藏不可冷凍。
ICYT	Cytosar freeze-dried powder for inj 100mg	調配好的溶液，其微生物學安定性室溫可維持6小時，冷藏可維持12小時。
ICYT5	Cytosar freeze-dried powder for inj 500mg	調配好的溶液，其微生物學安定性室溫可維持6小時，冷藏可維持12小時。
ID-G	Diagnogreen 25mg inj.	稀釋後無法保存
IDIN	Dipeptiven 100ml inj.	開瓶後立即使用。
IDTI	Dacarbazine 200mg inj. (DTIC)	2-8°C避光，不超過8小時。
IDYN	Dynastat 40mg inj.	調配後,室溫下24小時
IELO	Eloxatin 50mg inj.	稀釋後冷藏24小時。
IENB	Enbrel 25mg inj.	調配好的恩博溶液，應於調配後儘快使用。若沒有馬上使用，調配好的恩博溶液可於2-8°C(36-46°F)的冰箱內，儲存六小時。
IEND5	Endoxan 500mg inj.	添加溶劑調配後之溶液應於24小時內使用(儲存溫度不得高於8°C)。
IEPI	Epicin 20mg inj.	2-8°C，避光儲存，稀釋後立即或儘速使用。
IERB2	Erbix Solution for infusion 100mg	使用中的化學和物理安定性在25°C下維持48小時。Erbix 不含有任何抗菌的防腐劑或抑制細菌的藥劑。打開後要立即使用。如果沒有立即使用，使用者要對使用中的保存時間和情況負責，一般是在2°C - 8°C下不能超過24小時。
IESE	Esmeron solution 50mg inj.	經稀釋應立刻使用，並在24小時內完成投予，用剩的溶液應立刻丟棄。

## 藥品開封後貯存條件

10505整理

代碼	英文商品名	藥品開瓶後保存方法
IESM	Esmolol 100mg inj.	冷藏1週
IFAS	Fasturtec 1.5mg inj.	配製後貯存2-8°C下，24小時內使用完，未用完部份應丟棄。
IFIN	Finibax 250mg inj.	1.當以滅菌注射用水或0.9%生理食鹽水泡製後，Finibax懸浮液請在1小時內抽取注入射袋製備澄清溶液。 2.當懸浮液經生理食鹽水或5%葡萄糖液稀釋後，生理食鹽水室溫下12小時，2-8°C 24小時；5%葡萄糖液室溫下4小時，2-8°C 24小時
IFL1	Flumarin 1g inj.	配製後溶液須儘快使用。於室溫保存6小時，冰箱保存24小時。
IFO15	Formoxol 150mg inj.	25°C下，27小時。
IFOS2	Folsomycin 2gm for inj.	稀釋過後，< 25°C 24小時，4°C 48小時
IFOT	Forteo 750mcg inj.	冷藏2-8度，每支FORTEO注射筆自第一次注射可以繼續使用28天。過了28天使用期，即使仍有剩餘藥液，應丟棄FORTEO注射筆。不要與人共用注射筆。
IFOY	F.O.Y. 100mg inj.	chemical stability of drug sol'n after initial reconstitution 7 day. (refrigerated)
IFUN	Fungizone 50mg inj.	濃縮液(以10ml無菌注射用水配製後，含5mg/ml)置於暗處，室溫下24hr，或冷藏一週。
IFYT	Fytosid 100mg inj.	配製後48小時，稀釋後120小時，避光；不可冷藏。
IGEM	Gemzar 200mg inj.	不可冷藏；24hrs內使用完畢。
IGLU	GlucaGen 1mg inj.	調劑後混合溶液應立刻使用，罕見的情況下，如在配置後的溶液有纖維形成(黏著狀)或是有不溶物質，則應丟棄
IGM	Gentamycin 80mg inj.	冷藏48小時
IHAA	Halaven 1mg solution for injection	注射器中或稀釋過後室溫下4小時，冷藏24小時
IHB0	HyperHEP B S/D inj.(0.5ml/syring)	應立即使用，剩餘丟棄。
IHB5	HyperHEP B S/D inj.(5ml/vial)	應立即使用，剩餘丟棄。
IHEC	Herceptin 440mg inj.	小瓶中所提供的制菌注射用水混合後的配製後溶液，冷藏於2°C-8°C時，可以維持28天的安定。配製後的溶液含有防腐劑，所以適合多次使用，超過28天後，任何剩餘的溶液都應該丟棄。如果使用滅菌水配製440毫克小瓶，則配製後溶液僅維持24小時安定，之後必須丟棄。
IHO2	Holoxan 2g inj.	冷藏；24hrs內使用完畢。
IHULK	Humalog Mix50 KwikPen 300IU/3ml inj.	第一次使用後，當儲存於30°C以下，應於28日期限內使用
IHYC	Hycamtin 4mg inj.	不可冷藏；避光；24hrs內使用完畢。
II10	Lipofundin MCT/LCT 10% inj. (250ml)	開瓶後，未用完應丟棄。
IINN	Innohep 20000 Antixa IU Inj.	室溫15-25°C，儲存28天。
IINV	Invanz 1gm inj.	室溫6小時，5°C 24小時，自冷藏取出後須於4小時內使用，不可冷凍。
IIRI	Irican 100mg inj.	稀釋後立即使用或12hr內輸注完畢，開封後2-8°C下保存24hrs。
IJEV	Jevtana Concentrate and solvent for solution for infusion 60mg	第一次稀釋後的溶液必須立刻使用(30分鐘內)。 第二次(最終)稀釋的溶液在輸注袋中常溫下應於8小時內使用完畢(包括1小時的輸注時間)，若置於冷藏條件下，則不可超過24小時(包括1小時的輸注時間)。
IJEVF	Jevtana Concentrate and solvent for solution for infusion 60mg	第一次稀釋後的溶液必須立刻使用(30分鐘內)。 第二次(最終)稀釋的溶液在輸注袋中常溫下應於8小時內使用完畢(包括1小時的輸注時間)，若置於冷藏條件下，則不可超過24小時(包括1小時的輸注時間)。
IKA6F	Kadcyla 160mg inj. (自費加贈)	單次使用。2°C-8°C下最多可存放24小時
IKAD	Kadcyla 100mg inj.	單次使用。2°C-8°C下最多可存放24小時
IKADF	Kadcyla 100mg inj. (自費加贈)	單次使用。2°C-8°C下最多可存放24小時
IKCL	Potassium Chloride 15% 10ml inj.	稀釋過後室溫下24小時

## 藥品開封後貯存條件

10505整理

代碼	英文商品名	藥品開瓶後保存方法
IKEM1	Kemoplat 10mg inj.	開瓶後8小時,配製後- 24小時室溫下。
IKEM5	Kemoplat 50mg inj.	開瓶後8小時,配製後- 24小時室溫下。
IKEP	Kepra Concentrate for Solution for Infusion 500mg	diluted solutions are stable for up to 24 hours if stored in polyvinyl bags at controlled room temperature of 15 to 30 °C
IKY1	Kytril 1mg inj.	開瓶後室溫保存24hrs內。
ILA3	Lantus SoloStar 300IU/3ml inj.	第一次使用前注射筆需先存放在室溫下1-2小時,使用期間請勿儲存在高於25°C環境,開封後的注射筆不要放入冰箱。開啟後保存4週。
IL-D	Lipo-dox 20mg inj.	dextrose 5% 稀釋後, 24hrs 2-8°C。
ILEE	Levemir FlexPen 300IU/3ml inj.	使用中不超過30°C,最長可達6週。
ILI2	Lipoplus 20% 250ml	限單次使用,未使用完畢須丟棄
ILiy	Lincomycin Hcl 3g inj.	於一天內用完。
ILYA	Lyacety 500mg inj.	製成溶液後必須30分鐘內使用。
IM10	Moriamin-SN 1000ml/btl inj.	開封後,若有剩餘勿再使用。
IMA2	0.5% Marcaine	不含防腐劑,容器開啟後應立即使用,剩下的溶液應棄置不用。
IMA5	MabThera 500mg inj.	配製後貯存2-8°C下,24小時內使用完,未用完部份應丟棄。
IMAX	Maxipime 500mg inj.	室溫下24小時,仍然穩定;在冰箱中可保存7天。
IMC1	Mitomycin-C kyowa 10mg inj.	稀釋後- 立即使用。
IMED	Medason 40mg inj.	reconstituted sol'n should be used within 48hrs. (室溫)
IMEI	Metacin 0.5g inj.	調配後,請儘速使用(室溫下,須於24小時內用完)。
IMEP2	Mepem 250mg inj.	用等張的生理食鹽水溶解後,室溫6小時,5°C 24小時。
IM-S	Marcaine spinal heavy 0.5%	不含防腐劑,容器開啟後應立即使用,剩下的溶液應棄置不用。
IMSN	Moriamin-SN 200ml/btl inj.	開封後,若有剩餘勿再使用。
INAV	Navelbine 10mg inj.	冷避光;24hrs內使用完畢。
INIB	Nimbex 10mg inj.	本品不含抗菌防腐劑,故必須使用前才進行稀釋,且配製後要儘快使用,任何剩的溶液都應丟棄。
INMF	NovoMix 30 FlexPen 300U/3ml inj.	使用中不能置於冰箱內,置於novo nordisk胰島素注射器或隨身攜帶備用的novomix 30 penfill,可存放四個禮拜(不可超過30°C)。
INOPF	NovoRapid FlexPen 3ml 100U/ml inj.	第一次開封後或隨身攜帶作為備用時,請勿冷藏,存放於30°C以下,可保存四週
INPH	Humulin N 1000iu inj.	一旦使用可最多至28天,超過這個期間不能使用。小瓶貯存不能超過30°C
INSR	Humulin R 1000iu inj.	一旦使用可最多至28天,超過這個期間不能使用。小瓶貯存不能超過30°C
IOCI	Ocillina powder 500mg inj.	配製後溶液在室溫下可保存3天,冰箱(2-8°C)可保存1星期。
IOLC	Oliclinomel N4-550E Emulsion for infusion	混合後可於2-8°C下穩定高達七天或於25°C下達48小時。未使用混合前並可於25°C下保存兩年。不須避光。
IOME	Omezol I.V. Infusion 40mg inj.	以N/S為溶劑,泡好之溶液.應在12小時內用完,D5W則6小時。
IORE	Orencia lyophilized powder for IV infusion 250mg	完全稀釋過的溶液必須在24小時以前輸注完畢。使用前可於室溫儲存或2至8°C冷藏
IOXL	Oxaliplatin MERCK 50mg inj.	稀釋後室溫下24小時。
IPAC	Pancuronium Bromide-Fresenius 4mg inj.	Reconstituted pancuronium solution is stable for 48 hours
IPAN	Pantoloc IV 40mg inj.	配製後於12小時內使用
IPEG3	Penicillin G sodium 3MU inj.	配製後溶液,在室溫下可至少保存24小時,冷藏可保存一星期。
IPEI	Peg-intron 100 mcg inj.	調配以後,即刻使用或在2-8°C保存不超過24小時,丟棄任何未使用的溶液,粉末顏色改變即不可再使用
IPEJ	Perjeta 420mg inj.	單次使用。2°C-8°C下最多可存放24小時
IPEJF	Perjeta 420mg inj. (自費加贈)	單次使用。2°C-8°C下最多可存放24小時
IPH1	Pharmorubicin 10mg inj.	2-8°C 48小時,室溫下24小時。
IPH5	Pharmorubicin 50mg inj.	24hrs 2-8°C。

## 藥品開封後貯存條件

10505整理

代碼	英文商品名	藥品開瓶後保存方法
IP-I	Peg-intron 80 mcg inj.	調配以後, 即刻使用或在2-8°C保存不超過24小時, 丟棄任何未使用的溶液, 粉末顏色改變即不可再使用
IPIA	Pitamycin 2gm inj.	23°C 24hr。
IPIC	Picibanil 5KE inj.	開封後冷藏24週, 稀釋後冷藏8小時, 室溫1小時; 避光。
IPPO	Propofol-Lipuro 1% inj.	1. 打開安瓿或瓶蓋後乳劑必須馬上使用, 2. 含未稀釋的fresofol之器具必須在開瓶後12hrs更換, 3. 用glucose 5% or 0.9% NaCl稀釋過的靜脈注射液, 必須在無菌準備後立即使用, 不得超過6hrs。
IREL	Relaxin 500mg inj.	室溫下24小時, 2-8°C 14天
IROC	Rocephine 500mg inj.	室溫6小時, 5°C 24小時。
ISA1	Sandostatin 0.1mg inj.	SC- 回溫後再注射, 安瓿使用前才打開未用完應丟棄 IV- 建議使用生理食鹽水稀釋, 稀釋後25°C以下可保存24小時, 建議儘快用完,
ISA2	Sandostatin LAR 20mg inj.	施用當日保存於25°C以下, 並於注射前立即配製
ISA3	Sandostatin LAR 30mg inj.	施用當日保存於25°C以下, 並於注射前立即配製
ISEV	Sevatrim 480mg inj.	丟棄任何沒有被使用的已稀釋溶液。
ISHN	Shincort 50mg inj. (Kenacort-A)	三天室溫
ISIM	Simponi 50mg inj.	2°C至8°C避光冷藏貯存
ISM5	Solu-medrol 500mg inj.	reconstituted sol'n should be used within 48hrs. (室溫)
ISOB	Sod. Bicarbonate 1.4gm inj.	避光4小時
ISUA	Sulbactam 500mg inj.	所製備供肌肉或靜脈注射之sulbactam溶液或被稀釋含抗生素之點滴劑必須在24小時內使用。
ISUB	Subacillin 1.5gm inj.	肌肉注射濃縮液應在1小時使用。靜脈輸注, 視稀釋液而定使用期限: N/S- 濃度45mg/ml 25°C 8小時, 4°C 48小時。
ITA2	Taxotere 20mg inj.	混合前溶液含有10mg/ml docetaxel, 應在調製完成後儘速用(室溫或冷藏貯存2-8°C)8小時內, 可確保品質, 輸注溶液應在室溫四小時內使用。
ITAL	Tapimycin 4.5gm inj.	若置於室溫達24小時之後或置於冰箱(2-8°C)達48小時後, 應丟棄。
ITAR	Targocid 200mg inj.	24h, <4 C。
ITAT2	Tatumcef 2gm powder for inj.	以注射用水或可配合之輸注液調製成之溶液, 可於室溫中貯存18小時或於冰箱中存放7天仍保持理想的藥效。
ITAZ	Tazocin 2.25gm inj.	配製後之溶液應立即使用。未使用部份, 若置於室溫(20~25°C)達24小時之後或置於冰箱(2~8°C)達48小時之後, 應予拋棄。
ITE	Trace element 10ml inj.	開封後冷藏二週
ITER	Tetraspan 6% solution for infusion	限單次使用, 一旦打開後必須立即使用, 如有未用完的溶液, 應棄置勿用
ITIE	Tienam 500mg inj.	調配後室(25°C)4小時, 冷藏(4°C)24小時。
ITRN	Trandate 25mg inj.	未使用之混合液應於配製後24小時丟棄。
ITT1	Tetanus toxoid alum precipitated "KUO KWANG" inj.	經插入注射針吸取疫苗的瓶中疫苗, 應當日使用完畢
ITYG	Tygacil 50mg inj.	室溫下6小時, 或冷藏(2-8°C)24小時
ITYN	Tynen 20mg inj.	混合前溶液含有10mg/ml docetaxel, 輸注溶液應在室溫四小時內使用。
IURI	Urokinase 250,000 u inj.	開封後室溫24小時
IVAN5	Vancomycin 500mg I.V. inj.	以D5W、N/S溶液調配後須冷藏冰箱可保存14天。
IVEC	Velcade 3.5mg inj.	再製備之VELCADE可貯存於25°C, 且須於製備後八小時內給藥。
IVI	Vincristine sulphate 1mg inj.	避光冷藏24小時。
IVID	Vidaza 100mg Powder for Suspension for Injection	調配後在25°C下最多可保存1小時, 或在2-8°C下最多可保存8小時。
IVIO	Victoza 18mg/3ml solution for inj.	在首次使用後, 該筆可以在適當的室溫(15°C至30°C)下存放或是冰箱中(2°C-8°C)達30天。
IV-R	Varilrix 0.5ml inj.	稀釋後貯存於2-8°C, 8小時內用完
IXGE	Xgeva 120mg inj.	保存在25°C以下, 避光14天

## 藥品開封後貯存條件

10505整理

代碼	英文商品名	藥品開瓶後保存方法
IZALF	Zaltrap 100mg concentrate for solution for infusion	稀釋溶液在2-8°C下約可儲存4小時。輸注袋中剩下的任何未使用藥品應予丟棄。
IZOM	Zometa 4mg inj.	1.重新配製的溶液在室溫中可於24hrs內，保持化性和物性穩定。2.從重新配製，稀釋，保存在2-8°C的冰箱到輸注結束後不可超過24hrs。
IZOS	Zostavax inj.	稀釋液應另外貯存於室溫下(20至25°C)或冰箱中(2至8°C)。 泡製後的疫苗若未在30分鐘內使用，即應予以拋棄。 泡製後的疫苗切勿冷凍。
IZOV	Zovirax 250mg inj.	本劑不含抗菌防腐劑，因此本劑應在無菌情況下配製或稀釋，使用前才做此步驟，任何殘存藥液應丟棄之，配製好或稀釋過溶液不可冷藏，應存於25°C以下。
LPCT	Penicillin skin test 1000U/ml	配製或稀釋後貯存2-8°C，15天。(依瓶身標籤上有效期限)
OAC6	Actein Effervescent 600 mg tab.	發泡錠溶於水後冷藏2小時服用完畢。
OALK	Alkeran 2mg	冷藏2-8度
OBSO	Bisolvon 50ml solution	廠商建議-開瓶後冷藏，並儘快用完
OCO6	Codin-P 60ml Syrup	室溫下，避光，1個月
ODES	Destone 540mg tab.	本品應於冷乾的地方貯之，最好是冰箱內。
OIDO	Idofen supension	冷藏，避光，7-14天
OKOD	Colin solution 120ml (Koder)	室溫下(可冷藏)，避光，7-14天
OLBM	Liquid Brown Mixture 200ml (with opium)	室溫下，避光，1個月
OLEY	Lesyn F.C. 4mg tab.	本品為Alu-alu包裝；若剝半後剩餘1/2請放原泡殼及紙盒內，避光儲存，於48小內用完(以免抗氧化效價耗損)。
OM12	Megest oral suspension 120ml	室溫下，避光，1個月
OMI3	Mintapp 30ml syrup	開封後至溫下1個月
OSI4	Singulair oral granules 4mg	開封後必須立即服完小包內全部劑量(15分鐘內)
OS-S	Seridol oral solution 30mg/30ml/bot	開封後無須冷藏置於15°C至30°C間之乾燥處避光儲存可保存三個月。
OVES	Vesicare F.C. 5mg tab.	本藥為鋁箔排裝，藥品取出後請即刻服用。
OZIS	Zithromax Powder for Oral Suspension	泡製成口服液之後可於室溫下保持10天穩定。
XDOT	Dotarem	開瓶後未用完請丟棄
ZALA	Alcaine oph. sol. 15ml	若溶液變黃則丟棄不用
ZAZP	Azopt 1% 5ml eye drops, suspension	開瓶後，四星期
ZBIO	Biomycin oph sol. 3% 5ml	開瓶後一個月未用完，請丟棄
ZCIO	Ciloxan oph Sol. 5ml	開瓶後一個月未用完，請丟棄
ZCOS	Cosopt oph solu. 5ml	於15-30度以下避光儲存，一個月內用完
ZDEV	Devirux 3% Oph Oint. 4.5gm	開瓶後一個月未用完，請丟棄
ZENG	Engene eye drops 10ml	開瓶後一個月未用完，請勿繼續使用
ZISO	Isopto Carpine 2%. 15ml eye drops	開封後超過一個月請勿使用
ZSAN	Sancoba oph solution 5ml	開瓶後30天未用完，請丟棄
ZTEA	Tears Naturale oph solution 15ml	開封一個月後應即拋棄不用
ZTOD	Tobradex oph susp. 5ml	開瓶後一個月未用完，請丟棄
ZTRA	Travatan oph solu. 2.5ml	不得貯存於25°C以上的環境。 首次開封後4週內丟棄。
ZVID	Vidisic gel 10gm	as with all ophthalmic preparations, discard one month after opening. Do not store at temperatures above 25°C
ZXAL	Xalatan oph solu. 2.5ml	開瓶後，四星期內用完(開瓶後可儲存於室溫25度C下)
ZZAD	Zaditen Eye Drops 5ml	保存於25度以下，一個月內用完
	M-M-R II	稀釋後貯存於2-8°C，8小時內用完