

仁愛醫療財團法人化療藥品資訊一覽表 (化療室分機11133或11143) 2014-04-02

代碼	商品名	藥名	保存條件 (原裝瓶)	配製溶液	稀釋溶液	開封或配製後		稀釋後保存時間			配製注意事項	配製液顏色	警語
						RT	冷藏	RT	冷藏	避光			
IAl11	Alimta 100 mg	Pemetrexed	<25 °C	4cc N/S	NS only, in NS 100ml	24hrs	24hrs	24hrs	24hrs	-----	配製時緩慢輕轉小瓶至粉末完全溶解	無色澄清至淡黃綠色	與含鈣稀釋液具物理不相容性
IAl1	Alimta 500 mg	Pemetrexed	<25 °C	20cc N/S	NS only, in NS 100ml	24hrs	24hrs	24hrs	24hrs	-----	配製時緩慢輕轉小瓶至粉末完全溶解	無色澄清至淡黃綠色	與含鈣稀釋液具物理不相容性
IAVA 冰	Avastin100mg/4cc	Bevacizumab	2-8 °C, 避光	---	NS only	-----	-----	-----	24hrs	避光	稀釋前勿搖晃瓶身;不加spike	透明至乳白色	
IADI	Adriablastina 10mg	Doxorubicin	室溫,避光	內附5cc注射用水	NS · D5W	24hrs	48hrs	24hrs	48hrs	-----		深紅色	建議由輸注生理食鹽水之點滴管給藥。
IBLE	Bleocin 15mg	Bleomycin	<25 °C	5cc N/S	NS(better) · D5W	48hrs	-----	48hrs	-----	-----		白到淡黃色	肌肉注射時應避免在相同部位重複注射
ICAM	Campto 100mg/5cc	Irinotecan	<25 °C,避光	---	NS · D5W	12hrs	24hrs	24hrs	24hrs	-----		無色到微黃油	
ICAB	Carboplatin 150mg/15cc	Carboplatin	室溫,避光	---	NS · D5W(better)	8hrs	---	12hrs	36hrs	避光		無色澄清	不可使用含鋁針頭和鋁製給藥器組
IDTI 冰	DTIC 200mg	Dacarbazine	2-8°C, 避光	20cc D/W	NS · D5W	8hrs	96hrs	立即使用	8hrs	避光		淡黃色	若溶液由淡黃色變成粉紅色或紅色,應立即丟棄
IEEND5	Endoxan 500mg	cyclophosphamide	室溫	25cc N/S	NS · D5W	-----	24hrs	-----	24hrs	---	放震盪機溶解時需貼上PALAFILM封口	無色澄清	
IEPI 冰	Epicin 20mg/10cc	Epirubicin	2-8°C, 避光	---	NS · D5W	立即使用		立即使用		避光	避免長時間與鹼性溶液接觸	橘紅色	投藥不得少於3-4mins
IERB2 冰	Erbix 100mg/50cc 不用調配	Cetuximab	2-8°C	---	不可加稀釋液	20hrs	24hrs	-----	-----	-----	絕不可以和其他靜脈注射藥液混合	澄清無色	施打時,一定要使用0.22µm以下孔徑的過濾器過濾
IET	VP-16 100mg/5cc	Etoposide	室溫,避光	---	NS · D5W	48hrs	-----	120hrs	-----	避光	18號針頭	無色澄清油	應以30-60mins緩慢施打
IELO	Eloxatin 50mg/10cc	Oxaliplatin	室溫,避光	---	D5W only	4hrs	-----	24hrs	48hrs	-----	勿冷凍;勿使用含氯化鈉之溶液來配置或稀釋	無色澄清	
ISFU1	Fluorouracil 1g/20cc	Fluorouracil	室溫,避光	---	NS · D5W	72hrs	-----	48hrs	-----	避光		無色澄清	如曾放置於低溫處而發生沉澱用力搖晃使其達到60度,使用前降至體溫
IFO6	Formoxol 60mg/10cc	Paclitaxel	室溫,避光	---	NS · D5W	立即使用		27hrs	x	-----	18號針頭;限用玻璃瓶	無色到微黃油	應經由小於0.22µm以下孔徑的過濾器給藥
IFOX	Formoxol 30mg/5cc	Paclitaxel	室溫,避光	---	NS · D5W	立即使用		27hrs	x	-----	18號針頭;限用玻璃瓶	無色到微黃油	應經由小於0.22µm以下孔徑的過濾器給藥
IGEM	Gemzar 200mg	Gemcitabine	室溫	5cc N/S	NS only	立即使用		24hrs	結晶	-----	配製時若混濁表示N/S不夠	無色澄清	輸注時間不可超過60mins
IGEI 冰	Gemmis 228mg/6cc	Gemcitabine	2-8°C	---	NS only	24hrs	-----	24hrs	結晶	-----		無色澄清	輸注時間不可超過60mins
IHO2	Holoxan 2g	Ifosfamide	<25 °C	50cc D/W	NS · D5W	-----	24hrs	立即使用	24hrs	-----	放震盪機溶解時需貼上PALAFILM封口;或是用力振搖1分鐘即可	無色澄清	
IHYC	Hycamtin 4mg	Topotecan	室溫,避光	4cc D/W	NS · D5W	立即使用	24hrs	24hrs	x	-----		黃色-黃綠色	
IHEC 冰	Herceptin 440mg/20cc	Trastuzumab	2-8°C	內附20cc注射用水	NS only	28days		---	24hrs	-----	不可搖晃;鎖locker;不可以使用D5W	無色澄清	
IIRI 冰	Irican 100mg/5cc	irinotecan	2-8°C,避光	---	NS · D5W	12hrs	24hrs	12hrs	24hrs	-----		無色到微黃	
IJEV	Jevtana 60mg/1.5cc	cabazitaxel	室溫	內附5.7cc注射用水	NS · D5W	30mins	-----	8hrs	24hrs	-----	須用非PVC材質容器泡製加入稀釋液時需緩緩加入避免起泡	黃至棕黃濃稠	應經由小於0.22µm以下孔徑的過濾器給藥
IKEM1	Kemoplat 10mg/20cc	Cisplatin	室溫,避光	---	NS · D5W	8hrs	x	24hrs	x	避光		無色澄清	不可使用含鋁的注射器組
IKEM5	Kemoplat 50mg/100cc	Cisplatin	室溫,避光	---	NS · D5W	8hrs	x	24hrs	x	避光		無色澄清	不可使用含鋁的注射器組
IL-D 冰	Lipo-Dox 20mg/10cc	Doxorubicin liposome	2-8°C	---	D5W only	立即使用		立即使用	24hrs	-----	不可使用過濾器	深紅色	不可直接注射或未經稀釋注射
ILEP	Leuplin Depot 3.75mg/2ml	Leuprorelin	室溫	---	---	立即使用		立即使用		---	立即使用;假日不調配	白至黃色乳狀	ONLY SC勿搖樣
IMA1	Mabthera 100mg/10ml/vial 不用調配	Rituximab	2-8°C	---	NS · D5W	12hrs	24hrs	12hrs	24hrs	---		透明無色液體	不可i.v.push or bolus
IMA5	Mabthera 500mg/50ml/vial 不用調配	Rituximab	2-8°C	---	NS · D5W	12hrs	24hrs	12hrs	24hrs	---		透明無色液體	不可i.v.push or bolus
IMC1	Mitomycin-C 10mg/vail	Mitomycin-C	室溫,避光	25ccD/W	NS	---	---	立即使用		---	膀胱灌注:60ml針筒 每vail只需加10-12ml D/W; 避免與酸性注射液混合	藍紫色	
IMTX5	Methotrexat 500mg/5cc	MTX	室溫,避光	---	NS · D5W	24hrs	-----	24hrs	x	避光	婦產科處方抽針筒鎖locker	黃色	
INAV 冰	Navelbine 10mg/cc	Vinorelbine	2-8°C,避光	---	NS · D5W	24hrs	24hrs	24hrs	24hrs	---	不可使用鹼性溶液稀釋	無色至微黃	
IOXL	Oxaliplatin 50mg/10cc	Oxaliplatin	室溫	10cc D/W	D5W only	立即使用		立即使用	24hrs	---	不可用N/S稀釋	無色澄清	
IPAR	Paraplatin 150mg/15cc	Carboplatin	室溫,避光	---	NS · D5W(better)	---	---	8hrs	---	---		無色澄清	不可使用含鋁針頭和鋁製給藥器組
IPH1	Pharmorubicin 10mg	Epirubicin	室溫,避光	5cc N/S	NS · D5W	立即使用	24hrs	24hrs	48hrs	避光	應小心搖晃;避免反轉	橘紅色	投藥不得少於3-4mins
IPH5	Pharmorubicin 50mg	Epirubicin	室溫,避光	25cc N/S	NS · D5W	立即使用	24hrs	24hrs	48hrs	避光	應小心搖晃;避免反轉	橘紅色	投藥不得少於3-4mins
IPIC 冰	Picibanil 5KE(ok-432)		<10°C,避光	---	NS · D5W	---	2weeks	1hr	8hrs	---			
IPAI	Pamisol 30mg/10ml	Pamidronate	室溫	---	NS · D5W	-----	24hrs	-----	24hrs	---		無色澄清	不可IV bolus給藥
ITA2	Taxotere 20mg/1cc	Docetaxl	室溫,避光	---	NS · D5W	4hrs	8hrs	4hrs	-----	-----	18號針頭;假日不調配	淡黃油狀	
ITYN 冰	Tynen 20mg/1cc	Docetaxl	2-8°C,避光	---	NS · D5W	---	---	4hrs	-----	-----	18號針頭;假日不調配	黃色澄清溶液	
IVEC	Velcade3.5mg/1.4cc	Bortezomib	室溫	1.4cc N/S	NS	8hrs	---	8hrs	-----	-----	用3cc針筒抽取;鎖locker	無色澄清	限皮下注射
IVI 冰	Vincristine-TEVA 1mg/1cc	Vincristine	2-8°C,避光	---	NS · D5W	-----	24hrs	24hrs	48hrs	-----		無色澄清	不可做鞘內使用;僅做IV使用
IVIL1 冰	Vinblastine 10mg/10cc	Vinblastine	2-8°C,避光	---	NS	-----	24hrs	6hrs	-----	-----	僅做IV輸注	淡黃色澄清溶液	每週,避免滲漏

輸注長時間點滴避光參考來源:藥品仿單、台中榮民總醫院、林口長庚醫院、台北市立萬芳醫院。