

仁愛醫療財團法人化療藥品資訊一覽表 (化療室分機11133或11143) 2017-03-06

| 代碼 | 商品名 | 藥名(毒性分級) | 保存條件 (原裝瓶) | 配製溶液 | 稀釋溶液 | 開封或配製後 | | 稀釋後保存時間 | | | 配製注意事項 | 配製液顏色 | 警語 |
|-------|------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------------------|--------|-------|---------|-------|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | RT | 冷藏 | RT | 冷藏 | 避光 | | | |
| IALI | Alimta 100 mg | Pemetrexed | <25 °C | 4cc N/S | NS only, in NS 100ml | ----- | 24hrs | ----- | 24hrs | ----- | 配製時緩慢輕轉小瓶至粉末完全溶解 | 無色澄清至淡黃綠色 | 與含鈣稀釋液具物理不相容性 |
| IALI | Alimta 500 mg | Pemetrexed | <25 °C | 20cc N/S | NS only, in NS 100ml | ----- | 24hrs | ----- | 24hrs | ----- | 配製時緩慢輕轉小瓶至粉末完全溶解 | 無色澄清至淡黃綠色 | 與含鈣稀釋液具物理不相容性 |
| IADI | Adriblastina 10mg | Doxorubicin (2A) | 室溫,避光 | 內附5cc 注射用水 | NS、D5W | 24hrs | 48hrs | 24hrs | 48hrs | ----- | | 深紅色 | 建議由輸注生理食鹽水之點滴管給藥。 |
| IBLE | Bleocin 15mg | Bleomycin (2B) | <25 °C | 5cc N/S | NS(better)、D5W | 48hrs | ----- | 48hrs | ----- | ----- | 若IRRI,則針筒給藥不加點滴 | 白到淡黃色 | 肌肉注射時應避免在相同部位重複注射 |
| ICAM | Campto 100mg/5cc | Irinotecan | <25 °C避光 | ---- | NS、D5W | 12hrs | 24hrs | 24hrs | 24hrs | ----- | | 無色到微黃油 | |
| ICAO | Carboplatin 150mg/15cc | Carboplatin (2B) | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W(better) | 8hrs | ---- | 8hrs | ---- | ---- | | 無色澄清 | 不可使用含鋁針頭和鋁製給藥器組 |
| IDTI | DTIC 200mg | Dacarbazine (2B) | 2-8°C, 避光 | 20cc D/W | NS、D5W | 8hrs | 96hrs | 8hrs | 24hrs | 避光 | | 淡黃色 | 若溶液由淡黃色變成粉紅色或紅色,應立即丟棄 |
| IELO | Eloxatin 50mg/10cc | Oxaliplatin | 室溫,避光 | ---- | D5W only | 4hrs | ----- | 24hrs | 48hrs | ----- | 勿冷凍;勿使用含氯化鈉之溶液來配置或稀釋 | 無色澄清 | |
| IEND5 | Endoxan 500mg | Cyclophosphamide (1) | 室溫 | 25cc N/S | NS、D5W | 24hrs | 6days | 24hrs | 36hs | ---- | 放震盪機溶解時需貼上PALAFILM封口 | 無色澄清 | |
| IEPI | Epicin 20mg/10cc | Epirubicin | 2-8°C, 避光 | ---- | NS、D5W | 立即使用 | | 立即使用 | 避光 | | 避免長時間與鹼性溶液接觸 | 橘紅色 | 投藥不得少於3~4mins |
| I5FU1 | Fluorouracil 1g/20cc | Fluorouracil (3) | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 72hrs | ----- | 48hrs | ----- | 避光 | | 無色澄清 | 如曾放置於低溫處而發生沉澱用力搖晃使其達到60度,使用前降至體溫 |
| IFO15 | Formoxol 150mg/25cc | Paclitaxel | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 立即使用 | | 27hrs | x | ----- | 18號針頭 | 無色到微黃油 | 應經由小於0.22 μm以下孔徑的過濾器給藥 |
| IFYT | Fytosid 100mg/5cc | Etoposide (1) | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 5天 | ----- | 24hrs | ----- | 避光 | 18號針頭 | 無色澄清油 | 應以30~60mins緩慢施打 |
| IGEM | Gemzar 200mg | Gemcitabine | 室溫 | 5cc N/S | NS only | 立即使用 | | 24hrs | 結晶 | ----- | 配製時若混濁表示N/S 不夠 | 無色澄清 | 輸注時間不可超過60mins |
| IGEI | Gemmis 228mg/6cc | Gemcitabine | 2-8°C | ---- | NS only | 24hrs | ----- | 24hrs | 結晶 | ----- | | 無色澄清 | 輸注時間不可超過60mins |
| IHAA | Halaven 0.5mg/mL | Eribulin | 室溫 | ---- | NS only, max in NS 100ml | 4hrs | 24hrs | 4hrs | 24hrs | ----- | 只能加入100mL以下的N/S | 無色澄清 | 勿以葡萄糖溶液稀釋或用含葡萄糖溶液之靜脈注射管線給藥 |
| IHO2 | Holoxan 2g | Ifosfamide (3) | <25 °C | 50cc D/W | NS、D5W | ----- | 24hrs | 立即使用 | 24hrs | ----- | 放震盪機溶解時需貼上PALAFILM封口;或是用力振搖1分鐘即可 | 無色澄清 | |
| IHYC | Hycamtin 4mg | Topotecan | 室溫 | 4cc D/W | NS、D5W | 立即使用 | 24hrs | 立即使用 | 24hrs | ----- | | 黃色澄清 | |
| IIRI | Irican 100mg/5cc | irinotecan | 2-8°C,避光 | ---- | NS、D5W | 12hrs | 24hrs | 12hrs | 24hrs | ----- | | 無色到微黃 | |

| 代碼 | 商品名 | 藥名(毒性分級) | 保存條件(原裝瓶) | 配製溶液 | 稀釋溶液 | 開封或配製後 | | 稀釋後保存時間 | | | 配製注意事項 | 配製液顏色 | 警語 |
|-------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------|-------|-------|--|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | RT | 冷藏 | RT | 冷藏 | 避光 | | | |
| IJEV | Jevtana 60mg/1.5cc | cabazitaxel | 室溫 | 內附5.7cc注射用水 | NS、D5W | 30mins | ----- | 8hrs | 24hrs | ----- | 須用非PVC材質容器泡製 加入稀釋溶液時需緩緩加入避免起泡 | 黃至棕黃 濃稠 | 應經由小於0.22 μ m以下孔徑的過濾器給藥 |
| IKEM1 | Kemoplat 10mg/20cc | Cisplatin (2A) | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 48hrs | x | 20hrs | x | 避光 | | 無色澄清 | 不可使用含鋁的注射器組 |
| IKEM5 | Kemoplat 50mg/100cc | Cisplatin (2A) | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 48hrs | x | 20hrs | x | 避光 | | 無色澄清 | 不可使用含鋁的注射器組 |
| ILEP | Leuplin Depot 3.75mg/2ml 不用調配 | Leuprorelin | 室溫 | ---- | ---- | 立即使用 | | 立即使用 | | ---- | 立即使用；假日不調配 | 白至黃色乳狀 | ONLY SC勿搓揉 |
| IL-D | Lipo-Dox 20mg/10cc | Doxorubicin liposome (2A) | 2-8°C | ---- | D5W only | 立即使用 | | 立即使用 | 24hrs | ----- | 不可使用過濾器 | 深紅色 | 不可直接注射或未經稀釋注射 |
| IMTX5 | Methotrexat 500mg/5cc | MTX (3) | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 24hrs | ----- | 24hrs | x | 避光 | 婦產科處方抽針筒鎖locker | 黃色 | |
| IMC1 | Mitomycin-C 10mg/vail | Mitomycin-C (2B) | 室溫,避光 | 30-40ccD/W | NS | ---- | ---- | 立即使用 | | ---- | 膀胱灌注:60ml針筒 每vail只需加10-12ml D/W；避免與酸性注射液混合 | 藍紫色 | 針筒給藥 |
| INAV | Navelbine 10mg/cc | Vinorelbine | 2-8°C,避光 | ---- | NS、D5W | 24hrs | 24hrs | 24hrs | 24hrs | ---- | 不可使用鹼性溶液稀釋 | 無色至微黃 | |
| INOL | Nolbaxol 20mg/1ml | Docetaxl | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 立即使用 | ---- | 6hrs | 48hrs | ---- | 18號針頭；假日不調配 | 淡黃色至黃色濃稠液體 | 每次輸注時間為1hr,有結晶物出現應停止使用 |
| INOL8 | Nolbaxol 80mg/4ml | Docetaxl | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 立即使用 | ---- | 6hrs | 48hrs | ---- | 18號針頭；假日不調配 | 淡黃色至黃色濃稠液體 | 每次輸注時間為1hr,有結晶物出現應停止使用 |
| IORC | Orectalip 50mg/10ml | Oxaliplatin | 室溫,避光 | ---- | D5W only | 立即使用 | | 24hrs | ---- | 避光 | 勿冷凍；勿使用含氯化鈉之溶液來配置或稀釋 | 無色澄清 | 不可使用含鋁的注射器組 |
| IOXL | Oxaliplatin 50mg/10cc | Oxaliplatin | 室溫 | 10cc D/W | D5W only | 立即使用 | | 立即使用 | 24hrs | ---- | 不可用NS稀釋,22號針頭 | 無色澄清 | |
| IPAI | Pamisol 30mg/10ml | Pamidronate | 室溫 | ---- | NS、D5W | ----- | 24hrs | ----- | 24hrs | ---- | | 無色澄清 | 不可IV bolus給藥 |
| IPH1 | Pharmorubicin 10mg | Epirubicin | 室溫,避光 | 5cc N/S | NS、D5W | 立即使用 | 24hrs | 24hrs | 48hrs | 避光 | 應小心搖晃；避免反轉 | 橘紅色 | 投藥不得少於3~4mins |
| IPH5 | Pharmorubicin 50mg | Epirubicin | 室溫,避光 | 25cc N/S | NS、D5W | 立即使用 | 24hrs | 24hrs | 48hrs | 避光 | 應小心搖晃；避免反轉 | 橘紅色 | 投藥不得少於3~4mins |
| IPIC | Picibanil 5KE(ok-432) | | <10°C,避光 | | NS、D5W | ---- | 2weeks | 1hr | 8hrs | ---- | | | |
| ITA2 | Taxotere 20mg/1cc | Docetaxl | 室溫,避光 | ---- | NS、D5W | 4hrs | 8hrs | 4hrs | ----- | ----- | 18號針頭；假日不調配 | 淡黃油狀 | |
| ITYN | Tynen 20mg/1cc | Docetaxl | 2-8°C,避光 | ---- | NS、D5W | ---- | ---- | 4hrs | ----- | ----- | 18號針頭；假日不調配 | 黃色澄清溶液 | |
| IVEC | Velcade3.5mg/1.4cc | Bortezomib | 室溫 | 1.4cc N/S | NS | 8hrs | --- | 8hrs | ----- | ----- | 用3cc針筒抽取；鎖locker | 無色澄清 | 限皮下注射 |
| IVID | Vidaza 100mg | Azacitidine (2A) | 室溫 | 4ml 注射用水 | NS、LR | 1hrs | 8hrs | ----- | ----- | ----- | IV注射則需用10ml注射用水完全溶解；不用D5W稀釋；鎖locker | 白色懸浮液 | 限皮下注射,泡製後室溫1hr內使用完畢 |
| IVIL1 | Vinblastine 10mg/10cc | Vinblastine (3) | 2-8°C,避光 | ---- | NS | ----- | 24hrs | 6hrs | ----- | ----- | 僅做IV輸注 | 淡黃色澄清溶液 | 每週,避免滲漏 |

| 代碼 | 商品名 | 藥名(毒性分級) | 保存條件(原裝瓶) | 配製溶液 | 稀釋溶液 | 開封或配製後 | | 稀釋後保存時間 | | | 配製注意事項 | 配製液顏色 | 警語 |
|---------|----------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | RT | 冷藏 | RT | 冷藏 | 避光 | | | |
| IVI | Vincristine-TEVA 1mg/1cc | Vincristine (3) | 2-8°C,避光 | ---- | NS、D5W | ----- | 24hrs | 24hrs | 48hrs | ----- | | 無色澄清 | 不可做鞘內使用；僅做IV使用 |
| IZAL | Zaltrap 25mg/ml | Afibercept | 2-8°C,避光 | ---- | NS、D5W | 立即使用 | 4hrs | 8hrs | 24hrs | ----- | 稀釋濃度需在0.6~8mg/ml | 無色至淡黃色澄清 | 應經由0.2 μ m的polyethersulfone的過濾膜過濾,輸注時間需超過1hr |
| IAVA | Avastin100mg/4cc | Bevacizumab | 2-8°C, 避光 | ---- | NS only | ----- | ----- | ----- | 24hrs | 避光 | 稀釋前勿搖晃瓶身;不加spike | 透明至乳白色 | |
| IHEC | Herceptin 440mg/20cc | Trastuzumab | 2-8°C | 內附20cc 注射用水 | NS only | | 28days | ---- | 24hrs | ----- | 不可搖晃;鎖locker；不可以使用D5W | 無色澄清 | |
| IKAD(F) | Kadcyla 100mg/vial | Trastuzumab Emtansine | 2-8°C | 5mlD/W | NS only | 立即使用 | ----- | 立即使用 | 24hrs | ----- | 慢慢搖動小瓶,直到完全溶解為止。不可搖晃。不可用D5W稀釋 | 呈透明至些許乳白透光 | 需使用0.2-0.22微米管線內過濾器。 |
| IKA6(F) | Kadcyla 160mg/vial | Trastuzumab Emtansine | 2-8°C | 8mlD/W | NS only | 立即使用 | ----- | 立即使用 | 24hrs | ----- | 慢慢搖動小瓶,直到完全溶解為止。不可搖晃。不可用D5W稀釋 | 呈透明至些許乳白透光 | 需使用0.2-0.23微米管線內過濾器。 |
| IERB2 | Erbix 100mg/50cc 不用調配 | Cetuximab | 2-8°C | ---- | 不可加稀釋液 | 20hrs | 24hrs | ----- | ----- | 0 | 絕不可以和其他靜脈注射藥液混合 | 澄清無色 | 施打時,一定要使用0.22 μ m以下孔徑的過濾器過濾 |
| IMA1 | Mabthera 100mg/10ml/vial 不用調配 | Rituximab | 2-8°C | ---- | NS、D5W | 12hrs | 24hrs | 12hrs | 24hrs | ---- | | 透明無色液體 | 不可i.v.push or bolus |
| IMA5 | Mabthera 500mg/50ml/vial 不用調配 | Rituximab | 2-8°C | ---- | NS、D5W | 12hrs | 24hrs | 12hrs | 24hrs | ---- | | 透明無色液體 | 不可i.v.push or bolus |
| IKEY | Keytruda 50mg/vial 不用調配 | Pembrolizumab | 2-8°C | 2.3cc D/W | NS、D5W | 6hrs | 24hrs | 6hrs | 24hrs | ----- | 靜置5分鐘，直到完全溶解為止。不可搖晃。 | 呈透明至略帶乳白色的無色至淡黃色 | 使用0.9%N/S做稀釋,最終藥品濃度必須為1mg/ml~10mg/ml |
| IPEJ | Perjeta 420mg/14ml 不用調配 | Pertuzumab | 2-8°C,避光 | ---- | NS | 立即使用 | ----- | 24hrs | 避光 | | 不可使用5% Glucose稀釋 | | 不可冷凍；不可搖晃 |

輸注時間、點滴瓶、避光參考來源：藥品仿單、台中榮民總醫院、林口長庚醫院、台北市立萬芳醫院、Micromedex