

仁愛醫療財團法人化療藥品資訊一覽表 (化療室分機11133或11143) 2015-12-15

代碼	商品名	藥名(毒性分級)	保存條件 (原裝瓶)	配製溶液	稀釋溶液	開封或配製後		稀釋後保存時間			配製注意事項	配製液顏色	警語
						RT	冷藏	RT	冷藏	避光			
IALI	Alimta 100 mg	Pemetrexed	<25 °C	4cc N/S	NS only, in NS 100ml	-----	24hrs	-----	24hrs	-----	配製時緩慢輕轉小瓶至粉末完全溶解	無色澄清至淡黃綠色	與含鈣稀釋液具物理不相容性
IALI	Alimta 500 mg	Pemetrexed	<25 °C	20cc N/S	NS only, in NS 100ml	-----	24hrs	-----	24hrs	-----	配製時緩慢輕轉小瓶至粉末完全溶解	無色澄清至淡黃綠色	與含鈣稀釋液具物理不相容性
IADI	Adriblastina 10mg	Doxorubicin (2A)	室溫,避光	內附5cc 注射用水	NS、D5W	24hrs	48hrs	24hrs	48hrs	-----		深紅色	建議由輸注生理食鹽水之點滴管給藥。
IBLE	Bleocin 15mg	Bleomycin (2B)	<25 °C	5cc N/S	NS(better)、D5W	48hrs	-----	48hrs	-----	-----	若IRRI,則針筒給藥不加點滴	白到淡黃色	肌肉注射時應避免在相同部位重複注射
ICAM	Campto 100mg/5cc	Irinotecan	<25 °C避光	---	NS、D5W	12hrs	24hrs	24hrs	24hrs	-----		無色到微黃油	
ICAO	Carboplatin 150mg/15cc	Carboplatin (2B)	室溫,避光	---	NS、D5W(better)	8hrs	---	8hrs	---	---		無色澄清	不可使用含鋁針頭和鋁製給藥器組
IDTI	DTIC 200mg	Dacarbazine (2B)	2-8°C, 避光	20cc D/W	NS、D5W	8hrs	96hrs	8hrs	24hrs	避光		淡黃色	若溶液由淡黃色變成粉紅色或紅色,應立即丟棄
IELO	Eloxatin 50mg/10cc	Oxaliplatin	室溫,避光	---	D5W only	4hrs	-----	24hrs	48hrs	-----	勿冷凍;勿使用含氯化鈉之溶液來配置或稀釋	無色澄清	
IEND5	Endoxan 500mg	Cyclophosphamide (1)	室溫	25cc N/S	NS、D5W	24hrs	6days	24hrs	36hs	---	放震盪機溶解時需貼上PALAFILM封口	無色澄清	
IEPI	Epicin 20mg/10cc	Epirubicin	2-8°C, 避光	---	NS、D5W	立即使用		立即使用	避光		避免長時間與鹼性溶液接觸	橘紅色	投藥不得少於3~4mins
I5FU1	Fluorouracil 1g/20cc	Fluorouracil (3)	室溫,避光	---	NS、D5W	72hrs	-----	48hrs	-----	避光		無色澄清	如曾放置於低溫處而發生沉澱用力搖晃使其達到60度,使用前降至體溫
IFO15	Formoxol 150mg/25cc	Paclitaxel	室溫,避光	---	NS、D5W	立即使用		27hrs	x	-----	18號針頭	無色到微黃油	應經由小於0.22 μm以下孔徑的過濾器給藥
IFYT	Fytosid 100mg/5cc	Etoposide (1)	室溫,避光	---	NS、D5W	5天	-----	24hrs	-----	避光	18號針頭	無色澄清油	應以30~60mins緩慢施打
IGEM	Gemzar 200mg	Gemcitabine	室溫	5cc N/S	NS only	立即使用		24hrs	結晶	-----	配製時若混濁表示N/S 不夠	無色澄清	輸注時間不可超過60mins
IGEI	Gemmis 228mg/6cc	Gemcitabine	2-8°C	---	NS only	24hrs	-----	24hrs	結晶	-----		無色澄清	輸注時間不可超過60mins
IHAA	Halaven 0.5mg/mL	Eribulin	室溫	---	NS only, max in NS 100ml	4hrs	24hrs	4hrs	24hrs	-----	只能加入100mL以下的N/S	無色澄清	勿以葡萄糖溶液稀釋或用含葡萄糖溶液之靜脈注射管線給藥
IHO2	Holoxan 2g	Ifosfamide (3)	<25 °C	50cc D/W	NS、D5W	-----	24hrs	立即使用	24hrs	-----	放震盪機溶解時需貼上PALAFILM封口;或是用力振搖1分鐘即可	無色澄清	
IHYC	Hycamtin 4mg	Topotecan	室溫,避光	4cc D/W	NS、D5W	立即使用	24hrs	24hrs	x	-----		黃色-黃綠色	
IIRI	Irican 100mg/5cc	irinotecan	2-8°C,避光	---	NS、D5W	12hrs	24hrs	12hrs	24hrs	-----		無色到微黃	

代碼	商品名	藥名(毒性分級)	保存條件(原裝瓶)	配製溶液	稀釋溶液	開封或配製後		稀釋後保存時間			配製注意事項	配製液顏色	警語
						RT	冷藏	RT	冷藏	避光			
IJEV	Jevtana 60mg/1.5cc	cabazitaxel	室溫	內附5.7cc注射用水	NS、D5W	30mins	-----	8hrs	24hrs	-----	須用非PVC材質容器泡製 加入稀釋溶液時需緩緩加入避免起泡	黃至棕黃 濃稠	應經由小於0.22 μm以下孔徑的過濾器給藥
IKEM1	Kemoplat 10mg/20cc	Cisplatin (2A)	室溫,避光	----	NS、D5W	8hrs	x	24hrs	x	避光		無色澄清	不可使用含鋁的注射器組
IKEM5	Kemoplat 50mg/100cc	Cisplatin (2A)	室溫,避光	----	NS、D5W	8hrs	x	24hrs	x	避光		無色澄清	不可使用含鋁的注射器組
ILEP	Leuplin Depot 3.75mg/2ml 不用調配	Leuprorelin	室溫	----	----	立即使用		立即使用		----	立即使用；假日不調配	白至黃色乳狀	ONLY SC勿搓揉
IL-D	Lipo-Dox 20mg/10cc	Doxorubicin liposome (2A)	2-8°C	----	D5W only	立即使用		立即使用	24hrs	-----	不可使用過濾器	深紅色	不可直接注射或未經稀釋注射
IMTX5	Methotrexat 500mg/5cc	MTX (3)	室溫,避光	----	NS、D5W	24hrs	-----	24hrs	x	避光	婦產科處方抽針筒鎖locker	黃色	
IMC1	Mitomycin-C 10mg/vail	Mitomycin-C (2B)	室溫,避光	25ccD/W	NS	----	----	立即使用		----	膀胱灌洗:60ml針筒 每vail只需加10-12ml D/W；避免與酸性注射液混合	藍紫色	針筒給藥
INAV	Navelbine 10mg/cc	Vinorelbine	2-8°C,避光	----	NS、D5W	24hrs	24hrs	24hrs	24hrs	----	不可使用鹼性溶液稀釋	無色至微黃	
IOXL	Oxaliplatin 50mg/10cc	Oxaliplatin	室溫	10cc D/W	D5W only	立即使用		立即使用	24hrs	----	不可用NS稀釋,21號針頭	無色澄清	
IPAI	Pamisol 30mg/10ml	Pamidronate	室溫	----	NS、D5W	-----	24hrs	-----	24hrs	----		無色澄清	不可IV bolus給藥
IPH1	Pharmorubicin 10mg	Epirubicin	室溫,避光	5cc N/S	NS、D5W	立即使用	24hrs	24hrs	48hrs	避光	應小心搖晃；避免反轉	橘紅色	投藥不得少於3~4mins
IPH5	Pharmorubicin 50mg	Epirubicin	室溫,避光	25cc N/S	NS、D5W	立即使用	24hrs	24hrs	48hrs	避光	應小心搖晃；避免反轉	橘紅色	投藥不得少於3~4mins
IPIC	Picibanil 5KE(ok-432)		<10°C,避光		NS、D5W	----	2weeks	1hr	8hrs	----			
ITA2	Taxotere 20mg/1cc	Docetaxl	室溫,避光	----	NS、D5W	4hrs	8hrs	4hrs	-----	-----	18號針頭；假日不調配	淡黃 油 狀	
ITYN	Tynen 20mg/1cc	Docetaxl	2-8°C,避光	----	NS、D5W	----	----	4hrs	-----	-----	18號針頭；假日不調配	黃色澄清溶液	
IVEC	Velcade3.5mg/1.4cc	Bortezomib	室溫	1.4cc N/S	NS	8hrs	----	8hrs	-----	-----	用3cc針筒抽取；鎖locker	無色澄清	限皮下注射
IVID	Vidaza 100mg	Azacitidine (2A)	室溫	4ml 注射用水	NS、LR	1hrs	8hrs	-----	-----	-----	IV注射則需用10ml注射用水完全溶解；不用D5W稀釋；鎖locker	白色懸浮液	限皮下注射,泡製後室溫1hr內使用完畢
IVIL1	Vinblastine 10mg/10cc	Vinblastine (3)	2-8°C,避光	----	NS	-----	24hrs	6hrs	-----	-----	僅做IV輸注	淡黃色澄清溶液	每週,避免滲漏
IVI	Vincristine-TEVA 1mg/1cc	Vincristine (3)	2-8°C,避光	----	NS、D5W	-----	24hrs	24hrs	48hrs	-----		無色澄清	不可做鞘內使用；僅做IV使用
IZAL	Zaltrap 25mg/ml	Afibercept	2-8°C,避光	----	NS、D5W	立即使用	4hrs	8hrs	24hrs	-----	稀釋濃度需在0.6~8mg/ml	無色至淡黃色澄清	應經由0.2 μm的 polyethersulfone的過濾膜過濾,輸注時間需超過1hr

代碼	商品名	藥名(毒性分級)	保存條件 (原裝瓶)	配製溶液	稀釋溶液	開封或配製後		稀釋後保存時間			配製注意事項	配製液顏色	警語
						RT	冷藏	RT	冷藏	避光			
IAVA	Avastin100mg/4cc	Bevacizumab	2-8°C, 避光	----	NS only	-----	-----	-----	24hrs	避光	稀釋前勿搖晃瓶身;不加spike	透明至乳白色	
IHEC	Herceptin 440mg/20cc	Trastuzumab	2-8°C	內附20cc 注射用水	NS only		28days	----	24hrs	-----	不可搖晃;鎖locker;不可以使用D5W	無色澄清	
IKAD(F)	Kadcyla 100mg/vial	Trastuzumab Emtansine	2-8°C	5mlD/W	NS only	立即使用	-----	立即使用	24hrs	-----	慢慢搖動小瓶,直到完全溶解為止。不可搖晃。不可用D5W稀釋	呈透明至些許乳白透光	需使用0.2-0.22微米管線內過濾器。
IKA6(F)	Kadcyla 160mg/vial	Trastuzumab Emtansine	2-8°C	8mlD/W	NS only	立即使用	-----	立即使用	24hrs	-----	慢慢搖動小瓶,直到完全溶解為止。不可搖晃。不可用D5W稀釋	呈透明至些許乳白透光	需使用0.2-0.23微米管線內過濾器。
IERB2	Erbix 100mg/50cc 不用調配	Cetuximab	2-8°C	----	不可加稀釋液	20hrs	24hrs	-----	-----	0	絕不可以和其他靜脈注射藥液混合	澄清無色	施打時,一定要使用0.22 μ m以下孔徑的過濾器過濾
IMA1	Mabthera 100mg/10ml/vial 不用調配	Rituximab	2-8°C	----	NS、D5W	12hrs	24hrs	12hrs	24hrs	----		透明無色液體	不可i.v.push or bolus
IMA5	Mabthera 500mg/50ml/vial 不用調配	Rituximab	2-8°C	----	NS、D5W	12hrs	24hrs	12hrs	24hrs	----		透明無色液體	不可i.v.push or bolus
IPEJ	Perjeta 420mg/14ml 不用調配	Pertuzumab	2-8°C,避光	----	NS	立即使用	-----	-----	24hrs	避光	不可使用5% Glucose稀釋		不可冷凍;不可搖晃

輸注時間、點滴瓶、避光參考來源:藥品仿單、台中榮民總醫院、林口長庚醫院、台北市立萬芳醫院、Micromedex
毒性分級資料來源: IARC