



仁愛藥訊

九十四年六月出刊
季刊 Vol.10 Num.02

發行人：詹廖明義
編輯：藥劑部 (04)24819900-1139

本期要目

1. Q&A- 流感與感冒 ----- 陳品全藥師
2. 本院不適宜磨粉之口服藥品 ----- 潘美如藥師
3. 藥劑部花絮 94.03.01-94.05.31

Q&A- 流感與感冒

陳品全 藥師

Q：流感與感冒有什麼不同？

A：流行性感**冒**，簡稱**流感**，是通過呼吸道傳染的疾病。病徵包括發燒、頭痛、肌肉痛、流鼻水，喉嚨痛及咳嗽，病情一般持續數天至一周不等。引起流行性感**冒**的病毒很多，以甲類較為普遍。最常見的是甲型 H1N1 型，甲型 H3N2 型，及乙型**流**感。

一般的感冒病毒在侵入我們身體後，我們的身體裡面就產生對抗這種特殊病毒的抗體，這種保護力至少會持續數十年。所以，一般的感冒病毒並不容易引起大規模的流行。目前已知的感冒病毒至少有數百種，所以我們會不斷地得到不同病毒引起的感冒。流感病毒則是這數百種病毒當中相當特殊的一種，特點是很容易發生突變，當它發生突變的時候，大部分人都沒有免疫的能力，容易發生大規模的流行。

Q：流感疫苗有分 A、B 型？

A：今各的流感疫苗，內容包含了兩種 A 病毒及一種 B 病毒，都吻合了目前流行的形態，也就是說打一針即已全包，沒有再分哪一型的針劑。

Q：打了流感疫苗以後，就不會再感冒了？

A：流感疫苗的效果只能持續一、二年，而且每年都疫苗的成份都會改變，所以每年都需要打新的疫苗。因為有這種頻繁接種疫苗的缺點，所以一般只建議在高危險的人才必須每年接種疫苗。但是流感疫苗所引起的抗體反應在第二年就會明顯下降，所以還是必須再追加疫苗，才可以得到充分的保護效果。

Q：流感疫苗的禁忌？

A：1. 六個月以下嬰兒 2. 對雞蛋有過敏者 3. 有發燒或急性疾病者。

Q：懷孕與疫苗

A：孕婦得到流感的時候，發生併發症的危險性也比較高。所以在流行期，懷孕婦女可以接種流感疫苗。研究顯示疫苗對於孕婦並沒有特殊副作用。美國預防接種諮詢委員會的建議是如果懷孕四個月以後碰到流感的流行期，就必須接種疫苗。

Q：何謂克流感 Tamiflu(羅氏)？

A：疾病管制局所採購之流感抗病毒藥劑(克流感)是目前研究證明對 a 型及 b 型

流行性感冒均有治療功效的藥物，在病患發病的 48 小時內用藥可達最大療效。

Q：用量用法與不良反應？

A：建議口服劑量為 75mg 一天二次，連續服用 5 天。腎損傷病人肌酸甘清除率 10–30 ml/min，建議調整劑量為 75mg 一天一次。

不良反應：噁心、嘔吐、支氣管炎、失眠暈眩，少數有皮疹症狀發生。

注意事項：US FDA 妊娠等級分類-C，懷孕以及授乳婦女只有在評估可能治療效益較高時才用

Q：藥物使用對象？

A：(1)『新增對象』

疾病管制局為積極維護國人健康，自 94 年 3 月 1 日至 5 月 31 日擴大開放流感抗病毒藥劑之使用對象：僅限於 94 年 3 月 1 日至 5 月 31 日具類流感症狀之 13 歲以上、無用藥禁忌，且於發病後 48 小時內就醫者，均可使用疾病管制局所提供之抗病毒藥劑。

(2)『原使用對象』

兩類符合「新型流行性感冒」採檢條件者第一類：需包含 I 及 II，於採檢後投藥。

I：臨床症狀（三者任其一）：1 符合類流感病例通報定義，2 胸部 X 光片顯示肺炎者，3 結膜炎症狀

II：發病前十天內有以下經驗者（三者任其一）

1 於國內與禽畜（或其排泄物），或新型流行性感冒疑似病例接觸者；

2 曾赴三個月內有人傳人確定病例發生之境外地區之禽畜相關場所者；

3 從事家禽流行性感冒病毒，或新型流行性感冒病毒實驗工作者（第二類）快速惡化不明原因之肺炎病患，於採檢後投藥。

Q：類流感病例定義？

A：類流感病例定義（需同時符合下列三個條件）：1 突然發病有發燒耳溫 38°C 及呼吸道症狀；2 具有肌肉酸痛頭痛極度倦怠感其中一種症狀者；3 需排除單純性流鼻水扁桃腺炎與支氣管炎。

本院不適宜磨粉之口服藥品

潘美如 藥師

代碼	英文商品名	學名	含量及劑型	劑型	仿單或廠商建議事項
ONOM	Normacol Plus.	Sterculia . Frangula	7gm / 包 , granules	內服顆 粒劑	顆粒置於舌上, 勿嚼或壓, 須飲用足量的水, 以避免腸 阻塞
OLE8	Lescol-XL tab.	fluvastatin sodium	80mg extended release	長效緩 釋膜衣 錠	整顆吞服, 可撥半 (不破壞 緩釋劑型); 可磨粉但會破壞 緩釋劑型
OMS3	Morphine sulfate sustained-release "MSSR" tab.	Morphine Sulfate	30mg/tab	長效膜 衣錠	需整粒吞服不可嚼碎
OIPE	Ipentol control-release F.C. tab.	Pentoxifylline	400mg/tab	持續性 膜衣錠	
OG-T	Gastro-Timelet cap.	Metoclopramid e hydrochloride monohydrate SR	30mg/cap	持續性 藥效膠	
OMD1	Madopar HBS cap.	Levodopa+Bes erazide	100mg+ 25 mg /cap	持續性 藥效膠	吞服前不能打開, 以防效價 降低檔
OVEE	Verelan SR cap.	Verapamil HCl	120mg/cap	持續性 藥效膠	
OXA4	Xanthium cap.	Theophyllinum monohydricum	400mg/cap	持續性 藥效膠	
OXAN	Xanthium cap.	Theophyllinum monohydricum	200mg/cap	持續性 藥效膠	
OHYP	Hypoca cap.	Barnidipine HCl	10mg/capsul e	持續性 藥效膠 囊	由於體內藥動學的改變, 請 不要咬碎或將膠囊打開
OAD3	Adalat OROS 30 tab.	Nifedipine	30mg/extend ed release tab	持續性 藥效錠	不可咬嚼或弄碎服用
OCLA	Clarinase repetabs tab.	Loratadine + Pseudoephedri ne	5mg + 120mg	持續性 藥效錠	
OCO4	Coxine SR tab.	Isosorbide-5-m onontrate	40mg/tab	持續性 藥效錠	可分割成一半, 但不可咀嚼
ODEI	Depakine tab.	Sodium valproate + Valproic acid	333mg + 145mg/tab	持續性 藥效錠	
ODXL	Doxaben XL tab.	Doxazosin	4mg/tab	持續性 藥效錠	不可嚼碎, 分割或磨碎
OIMD	İmdur CR tab.	Isosorbide-5-mo nonitrate	60mg/tab.	持續性 藥效錠	可分成兩半, 不可咀嚼或壓 碎

代碼	英文商品名	學名	含量及劑型	劑型	仿單或廠商建議事項
ONAK	Nakamide SR tab.	Indapamide hemihydrate	1.5mg/tab.	持續性藥效錠	
ONIT	Nitrocontin continus tab.	Glyceryl Trinitrate	2.6mg/tab	持續性藥效錠	
OPHY	Phyllocontin tab.	Slow release aminophylline	225mg/tab	持續性藥效錠	需整錠服下不得嚼碎
OSLK	Slow-K tab.	Pot. chloride	600mg /tab	持續性藥效錠	整粒吞服
OVO7	Voltaren SR tab.	Diclofenac Sodium	75 mg/tab	持續性藥效錠	整片和不可咬碎及分割
OWEL	Wellbutrin S.R tab.	Bupropion HCl	150mg/tab.	持續性藥效錠	
OXA1	Xatral XL tab.	Alfuzosin HCl	10mg/tab	持續性藥效錠	請整粒吞服
OFEP	Felpin extended release tab.	Felodipine	5mg/tab	持續性釋放錠	不可剝半或咬碎
OTAL	Tamlosin S.R. cap.	Tamsulosin HCL	0.2mg/cap	持續釋放膠囊	請勿將膠囊內的顆粒咬碎或打開服用
OMUA	Muaction tab.	Tramadol HCl.	100mg/tab	持續釋放錠	
OVOM	Volamx tab.	Salbutamol sulfate	4mg/controlled release tab	持續釋放錠	應整粒吞服, 不可咀嚼或壓碎
OCA9	Cardizem Retard tab.	Diltizem HCl	90mg/tab	徐放錠	不可分半或咬碎
OBNS	Bensau cap.	Bemzonatate	100mg/soft cap	軟膠囊劑	膠囊勿於口中咬碎,因口咽部會有麻痺感
OBOK	Bokey cap.	Aspirin	100mg/cap	腸溶微粒膠囊	
OOME	Omelon Enteric-Microencapsulated cap.	Omeprazole	20mg/Cap	腸溶微粒膠囊劑	
OPAT	Pantoloc tab.	Pantoprazole sodium sesquihydrate	40mg/tab.	腸溶膜衣錠	不可嚼碎或壓碎
ODOX	Doxymycin cap.	Doxycycline	100mg/cap.	腸溶膠囊劑	宜整粒吞服, 不宜研磨或咬碎
OVOR	Voren enteric-microencapsulated cap.	Diclofenac sodium	50mg/cap	腸溶膠囊劑	
OFLA	Flagyl (Frotin) enteric sugar coated tab.	Metronidazole.	250mg/tab	腸溶糖衣錠	

代碼	英文商品名	學名	含量及劑型	劑型	仿單或廠商建議事項
OASA	Asacol tab.	Mesalazine(=Aminosalicylic acid meta-)	400mg/tab	腸溶錠	
OENA	Endase E.C. tab.	Serrapeptase(=Serratiopeptidase)	5mg/tab	腸溶錠	勿咬碎
OSAL	Salazopyrin tab.	Sulfasalazine	500mg/tab	腸溶錠	切勿咬碎
ODYA	DynaCirc SRO cap.	Isradipine	5mg/cap	緩釋膠囊劑	
ODI	Dicetel tab.	Pinaverium Bromide	50mg/tab	膜衣錠	不可嚼咀
OKEL	Kerlone F.C. tab.	Betaxolol HCl	20mg/tab	膜衣錠	勿咀嚼
OPAR	Pariet FC. tab.	sodium rabeprazole	20mg/tab	膜衣錠	本品不宜嚼碎或壓碎，應整顆吞服
OSE	Spasmo-Euvernil F.C. tab.	Sulfacarbamide+phenazopyridine	500mg+50mg/tab	膜衣錠	切勿咬碎
OT-C	Tegretol-CR tab.	Carbamazepine	200mg/tab	膜衣錠	不可咀嚼
OTOP	Topamax tab.	Topiramate	25mg/tab	膜衣錠	建議不要將其剝開
OSTA	Stazyme F.C. tab.	biodiastase 2000+cellulase AP3+lipase AP6+Prozyme 6	8000units+300units+900units+300units	膜衣錠	不可磨粉給藥(子母錠:子錠-含 lipase 及 prozyme, 包有腸衣在小腸溶解, 母錠-含 biodiastase 及 cellulase, 包胃溶性薄膜在胃中溶解)
OEX1	Exelon cap.	Rivastigmine	1.5mg/Cap	膠囊劑	必須與水整粒吞服, 不可撥開或壓碎
OEX4	Exelon cap.	Rivastigmine	4.5mg/Cap	膠囊劑	必須與水整粒吞服, 不可撥開或壓碎
OGLV	Glivec cap.	Imatinib mesylate	100mg/cap	膠囊劑	勿打開或磨此膠囊, 並配合一大杯水於中吞服之
OHAR	Harnalidge cap.	Tamsulosin HCL	0.2mg/cap	膠囊劑	勿將膠囊之顆粒咬碎或將膠囊打開服用
OHYD	Hydrea cap.	Hydroxyurea	500mg/cap	膠囊劑	病人若無法吞服膠囊時, 可將膠囊內容物直接倒入一杯水中並立刻服用, 此時某些無活性物質可能無法溶解, 而浮在水的表面上
OSEL	Seglor cap.	Dihydroergotamine Methanesulphonate	1.5 mg 立即釋放型 3.5 mg 持續釋放型	膠囊劑	請勿咬碎

代碼	英文商品名	學名	含量及劑型	劑型	仿單或廠商建議事項
OSPO	Sporanox cap.	Itraconazole	100mg/cap	膠囊劑	膠囊應整粒吞服
ODUL	Dulcolax (Bisacodyl S.C.) tab.	Bisacodyl	5mg/tab	糖衣錠	請整粒吞服, 勿咬碎
OFO7	Fosamax 70mg tab.	Alendronate sodium	70mg/tab	錠劑	勿剝半/勿磨粉/勿嚼碎
ONTG	Nitrostat tab.(NTG)	Nitroglycerin	0.6mg/tab	錠劑	舌下錠不可吞服只能口腔或 舌下使用
OSTR	Strocaine tab.	Oxethazine+po lymigel	5mg+224mg/ tab	錠劑	不要咬碎, 會有麻木感

藥劑部花絮 94.03.01-94.05.31

懷念舊同仁---王銘德、陳靜怡、劉素珊、洪美世、陳建成、劉玉晴、陳泰昇。
歡迎新同仁---郭郁文、經凌、李怡慧。

- 公佈 94 年度 3-5 月份本院員工服務暨教育點數活動一覽表，請同仁選擇適合自己的時段，並把握機會，適時的完成所需點數。機會會不定期公佈於佈告欄。6 月 30 日止結束上半年的活動：請於時間內完成員工服務點數 4 點和教育點數 3。
- **【醫務部持續教育】**教育點數：0.5 點。
 - A、講題：小兒腹瀉，由本院 林玠模醫師主講。
時間:03 月 03 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - B、講題：白內障手術—超音波晶體乳化術，由眼科 夏恆健主任主講。
時間:03 月 17 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - C、講題：乳癌及乳房疾病，由本院 孫志誠醫師主講。
時間:04 月 07 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - D、講題：認識 RU486，由婦產科 梁有勇醫師主講。
時間:04 月 21 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - E、講題：急診的 EQ，由本院 林豐彥主任主講。
時間:05 月 05 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - F、講題：腦中風之治療趨勢，由本院 廖嘉稜醫師主講。
時間:05 月 19 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - G、講題：實證醫學與臨床指引，由本院 黃祥生醫師主講。
時間:05 月 26 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
- **【共通性教育訓練課程】**教育點數：0.5 點。
 - 1. 講題：有效處理醫療糾紛，由高大成 教授主講。
時間:03 月 10 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - 2. 講題：外訓口頭報告（一），由本院外訓人員報告。
時間:03 月 23 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - 3. 講題：用心讓醫療更有感覺，由戴正德 教授主講。
時間:04 月 20 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - 4. 講題：外訓口頭報告（二），由本院外訓人員報告。
時間:04 月 27 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
 - 5. 講題：病人辨識與病人安全，由楊鳳凰 專員主講。
時間:05 月 04 日 12：30-13：30 於十樓泉生大講堂舉辦。
- **【市民講座】**教育點數：1 點。
 - 1. 三月份市民健康講座
時間:03 月 24 日 19：00-21：00 於文化中心演講廳舉辦。

講題：如何寶貝您的牙齒，由牙科 徐清良主任主講。

2. 四月份市民健康講座

時間:04月21日19:00-21:00於文化中心演講廳舉辦。

講題：藥您看...健康自我照護，由藥劑部 郭啟文主任主講。

3. 五月份市民健康講座

時間:05月19日19:00-21:00於文化中心演講廳舉辦。

講題：漫談異位性皮膚炎，由皮膚科 陳明仁主任主講。

以上活動需事先報名，並請攜帶點數卡參加。

● 【特別講座】教育點數：0.5點。請同仁踴躍參加，組長以上同仁必修。

■ 94年醫療事故風險管理－第一次訓練課程

時間：03/12(六)09:00~16:00 地點：十樓泉生大講堂

課程：1. Basic Principles of Risk Assessment And Management 江舟峰主任

2. 醫療風險管理近年發展驅勢 詹廖明義 總院長

3. 醫療不良事件的分析工具：RCA(Root Cause Analysis)介紹

RCA 實務演練一：RCA 準備

RCA 實務演練二：案例影帶播放、分組討論、分組報告醫策會廖

薰香組長

4.綜合討論

■ 94年醫療事故風險管理－第二次訓練課程

時間：05/14(六)09:00~16:00 地點：十樓泉生大講堂

課程：1.沒有安全就沒有醫療品質－First Do No Harm 詹廖明義 總院長

2.預防性抗生素的使用與感染管制 邱瑞浩主任

3.由知情同意談醫療風險管理 張之光主任

4.醫院暴力事件的預防與處理 李琳琳督導

5.談我國醫療責任的驅勢 蔡振修主任檢察官

6.綜合討論

● 94年全院性品管圈發表大會暨競賽活動已開鑼---

初賽分二梯：A：4月9日AM：8:30-12:00 B：4月16日AM：8:30-12:00。

決賽：4月23日AM：8:30-12:00

我們藥局參加第二梯次，請有空的同仁踴躍至10樓幫柔輔及其他圈友們加油！

● 號外~ 號外~

恭賀藥劑部獲得94年全院性品管圈發表會競賽活動佳作獎！